

Lonicera tomentella* Hook. f. et Thoms. var. *tomentella

落叶灌木,高达4米,当年小枝、叶柄和总花梗密被淡黄褐色绒状短柔毛;当年小枝浅棕色,有棱,二年生小枝紫褐色或灰褐色。叶卵状矩圆形至卵状披针形,长1.5—3.2厘米,顶端钝,基部截形至微心形,边缘背卷,上面散生短伏毛,下面灰绿色,密被短柔毛,中脉毛尤密,侧脉7—8对,连同中脉散生桔红色微腺;叶柄长2毫米以上。总花梗极短,长不到2毫米,果时达4毫米;苞片大,叶状,卵形至条状矩圆形,长达7毫米,毛被与叶同;杯状小苞片约为萼筒的1/2,无毛;相邻两萼筒连合过半,长约2.5毫米,无毛,萼檐长约1毫米,萼齿卵形,顶钝;花冠淡紫红色,筒状漏斗形,外被短倒伏毛,筒长约8毫米,内有短伏毛,裂片近相等,圆卵形,长约2.5毫米;雄蕊生于花冠筒上部,长短不一;柱头大,达花冠裂片基部。果实蓝黑色,圆形,直径约6毫米。花期7月,果熟期9月。

产西藏南部(亚东)。生于山坡林中或河边灌丛中,海拔2900—3000米。锡金也有分布。

6a. 察瓦龙忍冬(变种)(新拟)

***Lonicera tomentella* Hook. f. et Thoms. var. *tsarongensis* W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. 8: 168. 1921; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1043. 1936.**

叶下面常呈粉绿色,疏生短柔毛至无毛,有4—5对侧脉。花期6—8月。

产云南西北部和西藏东南部(波密、墨脱)。生于冷杉林、针阔叶混交林、冲积扇杨林下或沟谷旁灌丛中,海拔2000—3200米。模式标本采自云南贡山。

7. 岩生忍冬(植物分类学报) 西藏忍冬(拉汉种子植物名称)

***Lonicera rupicola* Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. 2: 168. 1858; Rehd. Syn. *Lonicera* 46. 1903; 徐炳声、王汉津,植物分类学报 22(1): 22. 1984. — *Caprifolium rupicolum* O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 1: 274. 1891. — *L. tibetica* Bur. et Franch. in Journ. de Bot. 5: 48. 1891; Rehd. in Sarg. Trees and Shrubs 1: 89, pl. 155. 1903; Hao in Contr. Lab. Bot. Nat. Acad. Peiping 1: 79. 1931, et 1: 101. 1932; Hara, Fl. East. Himal. 2: 125. 1971. — *L. rupicola* Hook. f. et Thoms. var. *tibetica* Zabel in Beiss. et al. Handb. Laubh.-Ben. 462. 1903.**

岩生忍冬(原变种) 图版 39: 1—6

Lonicera rupicola* Hook. f. et Thoms. var. *rupicola

落叶灌木,高达1.5(—2.5)米,在高海拔地区有时仅10—20厘米,幼枝和叶柄均被屈曲、白色短柔毛和微腺毛,或有时近无毛;小枝纤细,叶脱落后小枝顶常呈针刺状,有时伸长而平卧。叶纸质,3(—4)枚轮生,很少对生,条状披针形、矩圆状披针形至矩圆形,长0.5—3.7厘米,顶端尖或稍具小凸尖或钝形,基部楔形至圆形或近截形,两侧不等,边缘背卷,上面无毛或有微腺毛,下面全被白色毡毛状屈曲短柔毛而毛之间无空隙,很少毛较稀而有空隙,幼枝上部的叶有时完全无毛;叶柄长达3毫米。花生于幼枝基部叶腋,芳香,总