

规则 5 浅齿,齿端圆钝;花冠白色,顶端带玫瑰红色,唇形,筒漏斗状,长约 7 毫米,直径约 2 毫米,基部一侧具囊,外面具短硬毛,内面具糙毛,上唇长、宽各约 7 毫米,两面无毛,反曲,裂片矩圆形,下唇舌状,长约 8 毫米,宽约 4 毫米;花药长约 2.5 毫米,稍伸出花冠;花柱长 1 厘米,无毛,子房 3 室,每室 4—5 胚珠。果实不详。花期 4 月。

特产台湾中部。生于林中,海拔 3000—3900 米。

我们尚未见到本种的标本。根据其原始文献记载和附图,它具有花冠唇形、小枝和叶被具瘤基的硬毛等明显特征,与同亚组的其他种很易区别。

亚组 3. **短冠亚组** Subsect. 3. *Alpigenae* Rehd. Syn. *Lonicera* 102. 1903.

落叶灌木。冬芽内鳞常在幼枝伸长时增大且反折,宿存或早落。花冠唇形,筒较短,基部有囊,内密生柔毛;花柱有毛。果实红色。

本亚组我国有 6 种和 1 变种。

23. **华西忍冬**(中国高等植物图鉴)

裂叶忍冬(拉汉种子植物名称)

Lonicera webbiana Wall. [Cat. no. 476. 1829, nom. nud.]; ex DC. Prodr. 4: 336. 1830, descr.; Rehd. in Sarg. Trees and Shrubs 1: 137, pl. 69, et Syn. *Lonicera* 108. 1903; Kitam. in Fauna and Fl. Nepal Himal. 1: 234. 1955; Hara, Fl. East. Himal. 2: 125. 1971; 徐炳声、王汉津,植物分类学报 22(1): 24. 1984. — *L. heteroloba* Batal. in Acta Hort. Petrop. 12: 174. 1892. — *L. adenophora* Franch. in Journ. de Bot. 10: 311. 1896. — *L. tatsiensis* Franch. in opoc. cit. 313. — 中国高等植物图鉴 4: 291, 图 5995. 1975. — *L. alpigena webbiana* Nichols. Ill. Gard. Dict. Suppl. 502. 1901. — *L. alpigena* Linn. var. *phaeantha* Rehd. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 6: 272. 1909. — *L. alpigena* auct. non Linn. 1753: Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. 2: 171. 1858; Brandis, For. Fl. 256. 1874; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 15. 1880; Collett, Fl. Simla 225. 1902.

华西忍冬(原变种) 图版 43: 1—3

Lonicera webbiana Wall. ex DC. var. ***webbiana***

落叶灌木,高达 3(—4)米;幼枝常秃净或散生红色腺,老枝具深色圆形小凸起。冬芽外鳞片约 5 对,顶突尖,内鳞片反曲。叶纸质,卵状椭圆形至卵状披针形,长 4—9(—18)厘米,顶端渐尖或长渐尖,基部圆或微心形或宽楔形,边缘常不规则波状起伏或有浅圆裂,有睫毛,两面有疏或密的糙毛及疏腺。总花梗长 2.5—5(—6.2)厘米;苞片条形,长(1—)2—5 毫米;小苞片甚小,分离,卵形至矩圆形,长 1 毫米以下;相邻两萼筒分离,无毛或有腺毛,萼齿微小,顶钝、波状或尖;花冠紫红色或绛红色,很少白色或由白变黄色,长 1 厘米左右,唇形,外面有疏短柔毛和腺毛或无毛,筒甚短,基部较细,具浅囊,向上突然扩