

时均散生腺毛,后变无毛。冬芽鳞片多数,复瓦状排列,卵形,顶钝。叶纸质,倒卵形、倒卵状矩圆形至椭圆状矩圆形,长6—12厘米,顶端常急尾尖,基部宽楔形、圆形或有时截形,下面或仅中脉疏生硬毛,边有长睫毛;叶柄长6—15(—20)毫米。总花梗长(5—)8—23毫米,扁;苞片钻形,长3—5毫米,常超过萼筒;杯状小苞常有4浅圆裂,长约为萼筒的 $1/2$ — $2/3$;相邻两萼筒合生达 $1/2$,无毛,萼齿短,三角状卵形,顶钝,有疏缘毛。花冠乳白色或淡黄色,后变黄色,唇形,长1—1.2厘米,外面无毛,筒粗短,有深囊,基部突然收缩成柄状,内有长柔毛,裂片比筒稍长,上唇裂片卵形至宽椭圆形,长为唇瓣的 $1/3$,下唇反折;雄蕊和花柱与花冠几等高,花丝长短不一,无毛;花柱有柔毛。果实红色,圆形,直径约8—10毫米。花期4月,果熟期6月。

产安徽南部和西部(岳西、金寨)、浙江东部至西北部及江西(庐山)。生于溪涧杂木林中或山坡灌丛中,海拔900—1500米。模式标本采自江西九江*。

27. 吉隆忍冬(植物分类学报) 图版45

Lonicera jilongensis Hsu et H. J. Wang in Acta Phytotax. Sinica 17(4): 76. fig. 2. 1979.

落叶灌木,高1—2米;幼枝暗紫褐色,近圆筒状,连同叶柄和总花梗均密被灰白色短柔毛、微柔毛和微腺毛,二年生小枝灰棕色,有密实、白色的髓。冬芽外鳞片2对,外面一对较中间者略长,淡棕色,顶尖,背有1条隆起的脊,内鳞片1对,于小枝伸长后增大而呈叶状,绿色,反曲,两面被微腺毛。叶纸质,幼枝基部者最小,向上则渐变大,矩圆形、倒卵状矩圆形或卵状矩圆形,长(1.5—)2.5—5.5厘米,宽(0.8—)1—2.4厘米,顶端稍尖或钝而具小凸尖,基部圆至钝形,稀近截形,两侧稍不等,边缘常作不规则浅波状,有柔睫毛,上面被带白色细糙伏毛,下面被稍密的白色柔伏毛并夹杂微腺毛;叶柄长3—6毫米。总花梗果时长8—15毫米,通常单生于当年小枝基部的叶腋,基部有时反折;苞片狭条状披针形,果时长3—6毫米,外面和边缘有微腺毛和少数微糙毛;杯状小苞顶端全缘或很少有不规则浅钝裂,有时裂为2片,无毛;花未见。相邻两幼果分离,近圆形,直径约4毫米,无毛,宿存萼檐极短,有波状或近三角形的圆齿。

产西藏(吉隆)。生于桦木林内,海拔4150米。模式标本采自吉隆八号沟。

28. 丁香叶忍冬(植物分类学报) 图版43: 5—7

Lonicera oblata Hao ex Hsu et H. J. Wang in Acta Phytotax. Sinica 17(4): 77, fig. 3. 1979.

落叶灌木,高达2米;幼枝浅褐色,略呈四角形,老枝灰褐色;凡幼枝、芽的外鳞片、叶上面中脉和叶下面、叶柄、总花梗及苞片外面均被疏或密的短腺毛。冬芽有2对卵形、顶长尖的外鳞片。叶厚纸质,三角状宽卵形至菱状宽卵形,顶端短凸尖而钝头或钝形,基部

* 具体采集地点可能是庐山。



吉隆忍冬 *Lonicera jilongensis* Hsu et H. J. Wang: 1. 果枝, 2. 双果放大, 3. 冬芽放大。(张荣生绘)