

长阳。

本种同短梗忍冬 *L. graebneri* Rehd. 相近, 但本种花冠筒长约等于唇瓣或略较短, 萼筒有腺, 叶通常较小, 而那个种的花冠筒长为唇瓣之半, 萼筒无腺, 叶较大, 容易区别。

29a. 庐山忍冬(新拟) 庐山素忍冬(黄山植物的研究)

Lonicera modesta Rehd. var. *lushanensis* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 139. 1911; 徐炳声, 黄山植物的研究 177. 1965; 徐炳声, 植物分类学报 11(2): 202. 1966.

叶下面无毛或仅脉上有少量短柔毛。

产安徽南部和西部、浙江西北部(昌化)、江西西北部及湖南东北部(平江)。生于杂木林或灌丛中, 海拔 800—1650 米。模式标本采自江西庐山。

30. 短梗忍冬(中国高等植物图鉴)

Lonicera graebneri Rehd. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 6: 273. 1909; 中国高等植物图鉴 4: 292. 1975.

落叶灌木, 高达 3(—4) 米; 小枝、叶柄和叶上面初时疏生柔毛, 后变无毛。冬芽外鳞片 4—6 对, 顶尖, 背面有脊, 宿存, 内鳞片约 2 对, 增大。叶厚纸质, 椭圆状卵形、椭圆形至椭圆状矩圆形, 长 4—7.5(—8.5) 厘米, 下面疏生长柔毛, 中脉毛较密; 叶柄长 3—5 毫米。总花梗长约等于叶柄或略较长, 有疏柔毛或几无毛; 苞片钻形, 长约等于萼筒, 外面被短毛, 有腺缘毛; 杯状小苞长约为萼筒的 1/3, 2 裂, 有缘毛; 相邻两萼筒合生, 萼齿条状披针形, 有缘毛, 长约与萼筒等; 花冠淡黄色, 唇形, 长约 12 毫米, 筒基部被伏毛, 一侧稍隆起, 内面密生柔毛, 唇瓣长 2 倍于花冠筒, 上唇裂片短, 卵形; 雄蕊和花柱短于花冠, 花丝无毛; 花柱有伏毛。果实红色, 近圆形或卵圆形, 长约 8 毫米; 种子 3—4 颗, 淡黄褐色, 近圆形, 扁, 长 6 毫米, 有细点。花期 6 月, 果熟期 8—9 月。

产陕西南部及甘肃东南部及河南西部。生于山坡林中或灌丛中, 海拔 1400—2400 米。

31. 凹叶忍冬(植物分类学报) 图版 46: 5—6

Lonicera retusa Franch. in Journ. de Bot. 10: 313. 1896; Rehd. in Sarg. Trees and Shrubs 2: 49, pl. 123. 1907; 徐炳声、王汉津, 植物分类学报 22(1): 25. 1984. — *L. orientalis* Lam. var. *kachkarovii* Batal. in Acta Hort. Petrop. 14: 171. 1895. — *L. kachkarovii* (Batal.) Rehd. Syn. *Lonicera* 119. 1903. — *L. limprichtii* Pax et K. Hoffm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 12: 494. 1922; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1046. 1936.

落叶灌木, 高达 3 米; 幼枝无毛或疏生短腺毛, 连同叶柄和总花梗均带紫色。冬芽外鳞片 6 对, 披针形, 顶端尖, 直伸。叶纸质, 倒卵形、倒卵状匙形、椭圆形至宽卵形, 长 1—2.5 厘米, 顶端钝、截形或微凹, 稀稍尖, 基部楔形, 近基部具疏腺缘毛, 上面深绿色而无毛, 下面灰白色, 常有白粉及微毛, 两面叶脉隆起; 叶柄长 2—3 毫米, 无毛或有疏腺。总花梗