

48. 异萼忍冬(新拟)

Lonicera anisocalyx Rehd. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **6**: 271. 1909.

落叶灌木,小枝,叶柄和总花梗均被刚毛状粗硬毛。冬芽长约6毫米,有1对外鳞片。叶椭圆状卵形或矩圆状卵形,长1.5—3.5厘米,顶端尖或稍钝,基部圆,上面(主要在近叶缘处)被疏刚毛或近无毛,下面稍粉绿色,仅中脉具刚毛;花近于先叶开放,总花梗短;苞片卵形,顶端尖或渐尖,长1—1.5厘米,边缘有刚毛,相邻两萼筒分离,无毛,很少具腺,萼齿不等大,背轴者较长,有时与萼筒等长,无毛;花冠漏斗状,长约1.5厘米,外被极少硬毛,基部具腺或几秃净,筒具明显的囊,裂片矩圆状卵形,长为筒的2倍;雄蕊稍短于花冠裂片;花柱伸出。果实红色,卵圆形,长约1厘米。花期5月,果熟期7—8月。

产甘肃南部、青海东南部和四川北部。生于山地,海拔约3000米。

这个种看来同刚毛忍冬 *L. hispida* Pall. ex Roem. et Schult. 比较接近,但它具有花冠较小、裂片比筒长、萼齿明显而且不整齐等特征。

我们尚未见到过与本种的原始描述相符合的标本。采自四川木里的 J. F. Rock 23970, 花先叶开放,萼齿不整齐,其中一片较大,近似本种,但花冠筒比裂片长2倍,则又不相同。

49. 微毛忍冬(新拟) 蓝果忍冬(中国高等植物图鉴) 图版 51: 2

Lonicera cyanocarpa Franch. in Journ. de Bot. **10**: 314. 1896; Rehd. Syn. *Lonicera* 91. 1903; W. W. Smith in Notes Bot. Gard. Edinb. **10**: 46. 1917; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 1045. 1936; 中国高等植物图鉴 **4**: 290. 1975.——*L. minis* Rehd. in Sarg. Trees and Shrubs **2**: 50. 1907, Pl. Wils. **1**: 136. 1911, et in Fedde, Repert. Sp. Nov. **6**: 271. 1909.——*L. minis* Rehd. var. *hobsonii* Rehd. in Sarg. Trees and Shrubs 1. c.——*L. viridiflava* Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien. Math.-Nat. **61**: 201. 1924, et Symb. Sin. **7**: 1046, Taf. XVI, Abb. 9. 1936.

落叶灌木,高达1米,凡幼枝、叶柄、叶(尤其下面)、总花梗及苞片均密被肉眼难见的微糙毛;幼枝有棱,常带蓝色,老枝灰黄色,有时疏生短硬毛。冬芽长5—8毫米,有1对外鳞片,外面无毛。叶带革质,通常矩圆形,有时椭圆形,长1—3(—5)厘米,两端近圆形,顶具微凸尖,边缘或有时连同叶两面脉上有少数短硬毛;叶柄长2—6毫米。总花梗粗壮,略扁,长0.5—1(—1.5)厘米;苞片宽卵形,长1—1.5厘米;相邻两萼筒分离,无毛,萼檐短,齿不明显;花冠黄绿色,漏斗状,长(1.3—)1.5—2厘米,近整齐,筒基部有浅囊,裂片直立,宽卵形或卵形,长5—7毫米;雄蕊和花柱与花冠几等长,花柱下半部有糙毛。果实蓝黑色,卵圆形,长约1厘米,常具3—8颗种子;种子不整齐三角状矩圆形,深褐色,光亮,长4—5毫米。花期6—7月,果熟期8月。

产四川西部(康定、木里)、云南西北部和西藏东南部。生于石灰岩山脊、山坡林缘灌