

米。花期5—6月,果熟期始自7月。

产新疆西部。生于高山峭壁和岩坡上。苏联中亚地区也有分布。

58. 矮小忍冬(新拟)

Lonicera humilis Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. **15**: 370. 1842; Rehd. Syn. *Lonicera* 87. 1903; Pojark. in Fl. URSS **23**: 525. 1958. — *Caprifolium humile* O. Ktze. Rev. Gen. Pl. **1**: 274. 1891.

落叶矮小灌木,高12—40厘米,老枝多节,下部者平卧,幼枝极短,直立向上,密被肉眼难见的微柔毛,后变秃净。冬芽小,长约2毫米,卵圆形,顶尖,有数对鳞片,最下一对几乎包住整个芽体。叶质地厚硬,卵形、矩圆状卵形或卵状椭圆形,长7—20毫米,顶端短渐尖,基部圆楔形或圆形,初时两面密被硬伏毛,后毛渐变稀而留有散生的疣状突起,有时兼具腺毛,边缘有硬毛,叶脉在两面均显著;叶柄长1.5—2.5毫米,基部扩大而相连,密被长硬毛。总花梗出自幼枝基部叶腋,花时不发育,果时长2—5毫米,除被微柔毛外还有短伏毛和具短柄的腺毛;苞片卵形,较少卵状披针形,长6—11毫米,基部宽而包围萼筒,内外两面均被腺毛,边缘具硬毛;萼筒无毛或具细腺毛,萼檐长约1毫米,比萼筒短1/2,浅裂为不等的5宽齿,疏生长睫毛;花冠长15—20毫米,外面疏生开展的毛,筒细,喉部以上扩大,基部以上处具距状突起,上唇裂片卵形或几近半圆形,下唇长圆形,稍伸展;雄蕊短于上唇1/3—1/4;花柱略短于雄蕊。果实鲜红色,具蓝灰色粉霜,倒披针状卵圆形,长5—8毫米。花期6月,果熟期7—8月。

产新疆天山山脉。生于亚高山及高山石坡和峭壁石隙中。苏联中亚地区也有分布。

59. 截萼忍冬(新拟) 烂皮袄(新疆) 图版53: 1

Lonicera altmannii Regel et Schmalh. in Acta Hort. Petrop **5**: 610. 1878, et **6**: 304. 1880; Rehd. Syn. *Lonicera* 87. 1903; Pojark. in Fl. URSS **23**: 517. 1958. — *Caprifolium altmannii* O. Ktze. Rev. Gen. Pl. **1**: 274. 1891.

落叶灌木,高达2米;幼枝连同叶柄和总花梗均密被开展的微硬毛和腺毛,有时散生少数开展硬毛,毛脱落后留有小瘤状突起;枝淡黄褐色,无毛,髓白色。冬芽有数对鳞片。叶纸质,圆卵形至卵形,较少矩圆形,长2—4.5(—6.5)厘米,顶端稍尖或钝而有小尖头,基部圆形至截形,边缘常呈不规则波状,上面密生硬伏毛,毛基部膨大为小瘤状,下面密被短糙毛,脉上夹杂糙毛,边缘有长睫毛;叶柄长3—5毫米。花于叶后开放,生于当年小枝基部叶腋,总花梗长0.5—1.5(—2)厘米;苞片卵形或卵状披针形,长5—9毫米,顶端渐尖或尖,两面被短糙毛和腺毛,下面毛较密,有缘毛;相邻两萼筒分离,有腺毛,萼檐浅碟状,有疏腺毛,顶端近截形或浅波状,有糙缘毛;花冠淡黄色,长约1.5厘米,外面疏生小腺毛,且常夹杂少数开展糙毛,唇形,筒长约6毫米,基部有明显的囊,上唇长7—8毫米,下唇平展或稍反曲,长约8毫米;雄蕊和花柱约与花冠等长;花柱基部疏生糙毛。果实鲜红色,圆形,直径5—6毫米,顶端常具疏腺毛;种子淡黄褐色,矩圆形或椭圆形,长2.5—3毫米。