

亚组 10. 赭黄花亚组 Subsect. 10. *Ochranthae* Zabel emend. Rehd. Syn. *Lonicera* 133. 1903.

落叶灌木。冬芽有 4 对以上鳞片。小苞片分离, 很少连合; 萼檐干膜质或叶质; 花冠唇形; 雄蕊和花柱比花冠短; 花柱全被短柔毛。果实红色。

本亚组我国有 7 种、1 亚种和 4 变种。

62. 新疆忍冬(中国高等植物图鉴) 桃色忍冬(东北木本植物图志)

Lonicera tatarica Linn. Sp. Pl. 173. 1753; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 517, 图版 CLXVII, 418 及图版 CLXVIII, 12—14. 1955; P. S. Green in Journ. Arn. Arb. 47: 86, fig. 7. 1965; 中国高等植物图鉴 4: 293, 图 5999. 1975. ——*Caprifolium tataricum* O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 1: 274. 1891.

新疆忍冬(原变种) 图版 54: 1—4

Lonicera tatarica Linn. var. *tatarica*

落叶灌木, 高达 3 米, 全体近于无毛。冬芽小, 约有 4 对鳞片。叶纸质, 卵形或卵状矩圆形, 有时矩圆形, 长 2—5 厘米, 顶端尖, 稀渐尖或钝形, 基部圆或近心形, 稀阔楔形, 两侧常稍不对称, 边缘有短糙毛; 叶柄长 2—5 毫米。总花梗纤细, 长 1—2 厘米; 苞片条状披针形或条状倒披针形, 长与萼筒相近或较短, 有时叶状而远超过萼筒; 小苞片分离, 近圆形至卵状矩圆形, 长为萼筒的 $1/3$ — $1/2$; 相邻两萼筒分离, 长约 2 毫米, 萼檐具三角形或卵形小齿; 花冠粉红色或白色, 长约 1.5 厘米, 唇形, 筒短于唇瓣, 长 5—6 毫米, 基部常有浅囊, 上唇两侧裂深达唇瓣基部, 开展, 中裂较浅; 雄蕊和花柱稍短于花冠, 花柱被短柔毛。果实红色, 圆形, 直径 5—6 毫米, 双果之一常不发育。花期 5—6 月, 果熟期 7—8 月。

产新疆北部。生石质山坡或山沟的林缘和灌丛中, 海拔 900—1600 米。黑龙江和辽宁等地有栽培。苏联欧洲部分至西伯利亚地区也有分布。

62a. 小花忍冬(变种)(新拟) 图版 54: 5—6

Lonicera tatarica Linn. var. *micrantha* Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 39(1): 331. 1866; Rehd. Syn. *Lonicera* 130. 1903. ——*L. micrantha* Trautv. ex Regel in Acta Hort. Petrop. 5: 609. 1878, pro parte, quoad pl. Schrenk. ——*L. tatarica* Linn. var. *puberula* Regel et Winkl. in Acta Hort. Petrop. 6: 305. 1880. ——*Caprifolium micranthum* O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 1: 274. 1891.

全体多少呈粉绿色; 幼枝、叶柄和总花梗被密或疏的短柔毛和开展的微糙毛, 并散生无柄微腺。叶两面被白色短柔毛, 下面毛较密。苞片和小苞片外面被疏柔毛和无柄微腺, 边具睫毛; 萼齿有睫毛; 花冠黄白色, 外被微柔毛或几无毛, 筒长约等于唇瓣, 基部一侧不明显地隆起或有浅囊。花期 5 月。

产新疆伊犁自治州(巩留、新源)。生于河岸沙滩上, 海拔 700—860 米。苏联中亚和西