

部西伯利亚地区也有分布。

63. 长白忍冬(东北木本植物图志) 王八骨头、扁旦胡子(东北)

Lonicera ruprechtiana Regel in Gartenfl. 19: 68, t. 645. 1870; Rehd. Syn. *Lonicera* 135. 1903, et Bibl. Cult. Trees and Shrubs 623. 1949; 郝景盛, 中国北部植物图志 3: 49, 图 18. 1934; 刘慎谔等, 东北木本植物图志, 518, 图版 CLXIX, 5—9 及 CLXXA, 20. 1955.——*Xylosteum chrysanthum* β . *subtomentosum* Rupr. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 15: 369. 1857.——*L. chrysantha* Turcz. var. *subtomentosa* Maxim. in Mem. Div. Sav. Acad. Sci. St. Pétersb. 9 (Prim. Fl. Amur.): 136. 1859.——*Caprifolium ruprechtianum* O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 1: 274. 1891.

长白忍冬(原变种) 图版 54: 7—8

Lonicera ruprechtiana Regel var. **ruprechtiana**

落叶灌木, 高达 3 米; 幼枝和叶柄被绒状短柔毛, 枝疏被短柔毛或无毛; 凡小枝、叶柄、叶两面、总花梗和苞片均疏生黄褐色微腺毛。冬芽约有 6 对鳞片。叶纸质, 矩圆状倒卵形、卵状矩圆形至矩圆状披针形, 长 (3—)4—6(—10) 厘米, 顶渐尖或急渐尖, 基部圆至楔形或近截形, 有时两侧不等, 边缘略波状起伏或有时具不规则浅波状大牙齿, 有缘毛, 上面初时疏生微毛或近无毛, 下面密被短柔毛; 叶柄长 3—8 毫米; 总花梗长 6—12 毫米, 疏被微柔毛; 苞片条形, 长 5—6 毫米, 长超过萼齿, 被微柔毛; 小苞片分离, 圆卵形至卵状披针形, 长为萼筒的 $1/4$ — $1/3$, 无毛或具腺缘毛; 相邻两萼筒分离, 长 2 毫米左右, 萼齿卵状三角形至三角状披针形, 干膜质, 长 1 毫米左右; 花冠白色, 后变黄色, 外面无毛, 筒粗短, 长 4—5 毫米, 内密生短柔毛, 基部有 1 深囊, 唇瓣长 8—11 毫米, 上唇两侧裂深达 $1/2$ — $2/3$ 处, 下唇长约 1 厘米, 反曲; 雄蕊短于花冠, 花药长约 3 毫米, 花丝着生于药隔的近基部, 基部有短柔毛; 花柱略短于雄蕊, 全被短柔毛, 柱头粗大。果实桔红色, 圆形, 直径 5—7 毫米; 种子椭圆形, 棕色, 长 3 毫米左右, 有细凹点。花期 5—6 月, 果熟期 7—8 月。

产东北三省的东部。生于阔叶林下或林缘, 海拔 300—1100 米。朝鲜北部和苏联西伯利亚东部及远东地区也有分布。

63a. 光枝长白忍冬(变种)(新拟)

Lonicera ruprechtiana Regel var. **calvescens** Rehd. in Mittell. Deutsch. Dendr. Ges. 1912(21): 194. 1913.

幼枝近无毛或疏被短柔毛。叶下面或仅脉上疏生短柔毛, 边缘略有睫毛。果实深暗红色。

产黑龙江东部(伊春)。生河边林下。

64. 短萼忍冬(植物分类学报) 图版 54: 9—10

Lonicera breviseptala Hsu et H. J. Wang in Acta Phytotax. Sinica 17(4): 79, fig. 6. 1979.