

落叶灌木,高达2米;幼枝暗红褐色,连同叶下面、叶柄和总花梗均密被白色短柔毛,并散生微腺毛。冬芽小,有4对鳞片。叶纸质,倒卵形、倒卵状椭圆形至椭圆形,长2—4.5厘米,宽1—2厘米,顶端钝而具小凸尖或急尖,很少短渐尖,基部钝形,常稍两侧不等,上面疏生短糙伏毛,中脉毛较密,下面密被短柔毛,有缘毛;叶柄长3(—5)毫米。总花梗长10—16毫米;苞片条状披针形,长1—2毫米,短于萼筒,外面和边缘都有微柔毛;小苞片分离,圆卵形至长圆形,长1毫米左右,为萼筒的 $1/2-2/5$,边缘有小睫毛和微腺;相邻两萼筒分离,长约2毫米,萼齿宽卵形或半圆形,极短,长约为萼筒的 $1/8$,顶端圆,常具少数缘毛;花冠白色(?),外面无毛,唇形,筒粗短,长约4毫米,基部有1深囊,内密生短柔毛,上唇长约7毫米,两侧裂深达 $1/5$ 处,下唇长约8毫米,反曲;雄蕊短于花冠,花药长约2毫米,花丝着生于药隔的近基部,基部有短柔毛;花柱短于雄蕊,全被短柔毛,柱头粗大。果实深红色,圆形,直径约4毫米。花期5月,果熟期6月。

特产甘西南部(天水)。生于山谷冲积地,海拔1500—1800米。

本种与长白忍冬 *L. ruprechtiana* Regel 最接近,但那个种的叶卵状矩圆形至矩圆状披针形,较大,顶端渐尖或急渐尖,叶柄较长,总花梗较短,苞片长超过萼齿,小苞片极小,长为萼筒的 $1/2-2/5$,花药较长。

65. 金花忍冬(中国北部植物图志) 黄花忍冬(东北木本植物图志)

Lonicera chrysantha Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. **11**: 93. 1838, nom. nud., et ex Ledeb. Fl. Ross. **2**(1): 388. 1844; 郝景盛, 中国北部植物图志 **3**: 45, 图 16. 1934; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 516, 图版 CLXVII, 417 及 CLXVIII, 1—8. 1955; 中国高等植物图鉴 **4**: 293, 图 6000. 1975; 徐炳声、王汉津, 植物分类学报 **22**(1): 28. 1984. — *L. xylosteum* Linn. β . *chrysantha* Regel in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. St. Pétersb. **15**: 221. 1857, quoad basionym. — *Caprifolium chrysanthum* O. Ktze. Rev. Gen. Pl. **1**: 274. 1891. — *L. chrysantha* Turcz. var. *longipes* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. **24** (in Mém. Biol. **10**: 68) :44. 1878.

金花忍冬(原亚种) 图版 55: 1—3

Lonicera chrysantha Turcz. subsp. *chrysantha*

落叶灌木,高达4米;幼枝、叶柄和总花梗常被开展的直糙毛、微糙毛和腺。冬芽卵状披针形,鳞片5—6对,外面疏生柔毛,有白色长睫毛。叶纸质,菱状卵形、菱状披针形、倒卵形或卵状披针形,长4—8(—12)厘米,顶端渐尖或急尾尖,基部楔形至圆形,两面脉上被直或稍弯的糙伏毛,中脉毛较密,有直缘毛;叶柄长4—7毫米。总花梗细,长1.5—3(—4)厘米;苞片条形或狭条状披针形,长2.5(—8)毫米,常高出萼筒;小苞片分离,卵状矩圆形、宽卵形、倒卵形至近圆形,长约1毫米,为萼筒的 $1/3-2/3$;相邻两萼筒分离,长2—2.5毫米,常无毛而具腺,萼齿圆卵形、半圆形或卵形,顶端圆或钝;花冠先白色后变黄色,长(0.8—)1—1.5(—2)厘米,外面疏生短糙毛,唇形,唇瓣长2—3倍于筒,筒内有短柔毛,