

花冠、小苞片和幼叶均带淡紫红色。

产甘肃、江苏(南京、江浦、句容)、安徽(滁县琅琊山)和河南(鸡公山)。生于山坡。

67. 毛花忍冬(拉汉种子植物名称)

Lonicera trichosantha Bur. et Franch. in Journ. de Bot. 5: 48. 1891. — *L. ovalis* Batal. in Acta Hort. Petrop. 14: 170. 1895. — *L. trichosantha* Bur. et Franch. forma *glabrata* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 35. 1926, syn. nov. — *L. trichosantha* Bur. et Franch. forma *acutiuscula* Rehd. l. c. 36.

毛花忍冬(原变种)

Lonicera trichosantha Bur. et Franch. var. **trichosantha**

落叶灌木,高达3—5米;枝水平状开展,小枝纤细,有时蜿蜒状屈曲,连同叶柄和总花梗均被疏或密的短柔毛和微腺毛或几秃净。冬芽有5—6对鳞片。叶纸质,下面绿白色,形状变化很大,通常矩圆形、卵状矩圆形或倒卵状矩圆形,较少椭圆形、圆卵形或倒卵状椭圆形,长2—6(—7)厘米,顶端钝而常具凸尖或短尖至锐尖,基部圆或阔楔形,较少截形或浅心形,两面或仅下面中脉疏生短柔伏毛或无毛,下面侧脉基部有时扩大而下沿于中脉,边有睫毛;叶柄长3—7毫米。总花梗长2—6(—12)毫米,短于叶柄,果时则超过之;苞片条状披针形,长约等于萼筒;小苞片近圆卵形,长约2毫米,为萼筒的 $1/2-2/3$,顶端稍截形,基部多少连合;相邻两萼筒分离,长约2毫米,无毛,萼檐钟形,干膜质,长1.5—2(—4)毫米,全裂成2片,一片具2齿,另一片3齿,或仅一侧撕裂,萼齿三角形;凡苞片、小苞片和萼檐均疏生短柔毛及腺,稀无毛;花冠黄色,长12—15毫米,唇形,筒长约4毫米,常有浅囊,外面密被短糙伏毛和腺毛,内面喉部密生柔毛,唇瓣外面毛较稀或有时无毛,上唇裂片浅圆形,下唇矩圆形,长8—10毫米,反曲;雄蕊和花柱均短于花冠,花丝生于花冠喉部,基部有柔毛;花柱稍弯曲,长约1厘米,全被短柔毛,柱头大,盘状。果实由橙黄色转为橙红色至红色,圆形,直径6—8毫米。花期5—7月,果熟期8月。

产陕西南部、甘肃南部、四川西部、云南西北部和西藏东部。生于林下、林缘、河边或田边的灌丛中,海拔2700—4100米。模式标本采自四川巴塘。

67a. 长叶毛花忍冬(变种)(植物分类学报) 干萼忍冬(中国高等植物图鉴)

Lonicera trichosantha Bur. et Franch. var. **xerocalyx** (Diels) Hsu et H. J. Wang in Acta Phytotax. Sinica 22(1): 29. 1984. — *L. deflexicalyx* Batal. in Acta Hort. Petrop. 12: 173. 1892; 中国高等植物图鉴 4: 294. 1975. — *L. xerocalyx* Diels in Notes Bot. Gard. Edinb. 25: 177. 1912. — *L. deflexicalyx* Batal. var. *xerocalyx* (Diels) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 36. 1926.

叶矩圆状披针形至披针形,很少卵状披针形或卵状矩圆形,长4—8(—10)厘米,顶端长渐尖至短渐尖。

产甘肃南部(舟曲)、四川西部和云南西北部。生于沟谷水旁、林下、林缘灌丛中或阳