

紫色。叶薄革质,卵状矩圆形或卵状披针形,稀卵形,长7—10.5厘米,顶端渐尖、急尖或具小尖突,基部圆形、截形或宽楔形,边缘微背卷,具缘毛或无毛,两面无毛或下面中脉疏生少数糙毛,下面脉凸起;叶柄长7—15毫米,基部相连而在小枝节上呈线状凸起。双花生于小枝上部叶腋或集成短总状花序,味香;总花梗长达1.5厘米;苞片、小苞片和萼齿都有缘毛;苞片狭条状披针形,长约2毫米,与萼筒几等长;小苞片圆卵形或卵形,顶端圆或钝,长约为萼筒的1/2;萼筒矩圆形,长约2毫米,萼齿三角状披针形,长1—1.5毫米;花冠白色,后变淡黄色,长(4—)6厘米,唇形,筒长近4厘米,外面无毛或有时具极少糙毛,内面疏被柔毛,唇瓣长约2厘米,外面疏生糙毛,上唇两侧裂矩圆形,裂隙深达6毫米,中裂卵形,较短,下唇带状,反折;雄蕊略短于花冠,花丝无毛;花柱与花冠几等长,无毛。果实白色,椭圆形,长约1厘米。

特产海南。生于山谷密林或水边沙地的灌丛中,海拔300—1400米。模式标本采自昌感。

大花忍冬 *L. macrantha* (D. Don) Spreng. 与本种的区别在于小枝、叶和花冠均密被淡黄褐色长糙毛,花冠筒长至多为唇瓣的1.5倍,雄蕊和花柱均伸出。

85. 长花忍冬(新拟) 图版 66: 1—2

Lonicera longiflora (Lindl.) DC. Prodr. 4:331. 1830; Benth. Fl. Hongk. 143. 1861; Hao in Contr. Lab. Biol. Nat. Acad. Peiping 1: 76. 1931. — *Caprifolium longiflorum* “Sabine” Lindl. Bot. Reg. 15, pl. 1232. 1829; O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 1: 274. 1891. — *Nintooa longiflora* Sweet, Hort. Brit. ed. 2, 258. 1830.

藤本;除幼枝、叶柄和花序有时略被黄褐色糙毛外,全体几无毛;枝与小枝红褐色或紫褐色,平滑。叶纸质或薄革质,卵状矩圆形至矩圆状披针形,很少卵形,长5—8(—11)厘米,顶端渐尖,基部圆至宽楔形,上面光亮,侧脉3—5对,小脉水平状,下面脉均显著凸起而呈网格状;叶柄长5—8(—15)毫米,基部相连而在节部呈线状凸起。双花常集生于小枝顶呈疏散的总状花序;总花梗与叶柄等长或略超过;苞片条状披针形,长2—2.5毫米,常有缘毛;小苞片圆卵形,长约1毫米,无毛;萼筒矩圆形,长2.5毫米,无毛,萼齿三角状披针形,长达1.5毫米,顶端长渐尖,有缘毛;花冠白色,后变黄色,长5—7.5厘米,外面无毛或散生少数开展长腺毛,更或有倒生糙毛,唇形,筒细,唇瓣长约为筒的1/2。果实成熟时白色。花期3—6月,果熟期10月。

产广东南部、海南和云南(马关)。生于疏林内或山地路旁向阳处,海拔达1700米。

86. 卷瓣忍冬(植物分类学报) 图版 66: 3—4

Lonicera longituba H. T. Chang ex Hsu et H. J. Wang in Acta Phytotax. Sinica 17(4): 82, fig. 9. 1979.

藤本,全体几无毛;枝和小枝有棱条。叶薄革质,倒披针状矩圆形或矩圆形,长4~6.5厘米,顶端渐尖,基部楔形或钝,下延于长达1厘米的柄,边缘微背卷,两面中脉凸起,侧脉



1—2.长花忍冬 *Lonicera longiflora* (Lindl.) DC.; 1.花(原大), 2.叶(原大)。3—4.卷瓣忍冬 *Lonicera longituba* H. T. Chang ex Hsu et H. J. Wang; 3.花枝, 4.苞片、小苞片和花萼放大。(张荣生绘)