

折;雄蕊稍超出花冠,花丝无毛或内侧有一行稀疏白毛,花药长2.5—3毫米;花柱伸出,无毛,柱头粗大。果实蓝黑色,椭圆形,长7—8毫米。花期6—7月,果熟期10—11月。

产江西西南部、湖南中北部和中南部至西部、湖南南部、广东及广西东北部。生于山地灌丛或林中,海拔400—1100米。模式标本采自江西宁都莲花山。

花供药用,在江西上犹县作“金银花”收购,但产量甚少。

这个种的整个植株几乎都为黄褐色或黄白色毡毛所覆盖,显得非常突出。

Ker, Bogor 和 van Steenis (Fl. Malesiana ser. 1, 4(3): 178. 1954) 曾经指出采自江西龙南的本种标本——刘心祁 4649, 同产于苏门答腊的 *L. pulcherrima* Ridl. 似相吻合。我们因没有见到后一种的标本,未能作出判断,姑志于此,留待后考。

92. 细毡毛忍冬(植物分类学报) 细苞忍冬(拉汉种子植物名称)

Lonicera similis Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 366. 1888; Rehd. Syn. *Lonicera* 155. 1903; 郝景盛, 中国北部植物图志 3: 23, 图 5. 1934; 徐炳声、王汉津, 植物分类学报 22(1): 30. 1984. —— *Caprifolium simile* O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 1: 274. 1891. —— *L. macrantha* DC. var. *biflora* Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 28: 63. 1891. —— *L. delavayi* Franch. in Journ. de Bot. 10: 310. 1896. —— *L. similis* Hemsl. var. *delavayi* (Franch.) Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 142. 1911.

细毡毛忍冬(原变种) 图版 63: 8—9

Lonicera similis Hemsl. var. *similis*

落叶藤本;幼枝、叶柄和总花梗均被淡黄褐色、开展的长糙毛和短柔毛,并疏生腺毛,或全然无毛;老枝棕色。叶纸质,卵形、卵状矩圆形至卵状披针形或披针形,长3—10(—13.5)厘米,顶端急尖至渐尖,基部圆或截形至微心形,两侧稍不等,有或无糙缘毛,上面初时中脉有糙伏毛,后变无毛,侧脉和小脉下陷,下面被由细短柔毛组成的灰白色或灰黄色细毡毛,脉上有长糙毛或无毛,老叶毛变稀而网脉明显凸起;叶柄长3—8(—12)毫米。双花单生于叶腋或少数集生枝端成总状花序;总花梗下方者长可达4厘米,向上则渐变短;苞片、小苞片和萼齿均有疏糙毛及缘毛或无毛;苞片三角状披针形至条状披针形,长约2(—4.5)毫米;小苞片极小,卵形至圆形,长约为萼筒的1/3;萼筒椭圆形至长圆形,长2(—3)毫米,无毛,萼齿近三角形,长约1毫米,宽近相等;花冠先白色后变淡黄色,长4—6厘米,外被开展的长、短糙毛和腺毛或全然无毛,唇形,筒细,长3—3.6厘米,超过唇瓣,内有柔毛,上唇长1.4—2.2厘米,裂片矩圆形或卵状矩圆形,长2—5.5毫米,下唇条形,长约2厘米,内面有柔毛;雄蕊与花冠几等高,花丝长约2厘米,无毛;花柱稍超出花冠,无毛。果实蓝黑色,卵圆形,长7—9毫米;种子褐色,稍扁,卵圆形或矩圆形,长约5毫米,有浅的横沟纹,两面中部各有1棱。花期5—6(—7),果熟期9—10月。

产陕西南部,甘肃南部,浙江西北部和西南部,福建,湖北西部,湖南西部,广西(都