

安),四川北部、东部至西南部,贵州西部至北部和云南东部至北部。生于山谷溪旁或向阳山坡灌丛或林中,海拔 550—1600 米(川、滇可达 2200 米)。缅甸也有分布。模式标本采自湖北宜昌。

花供药用,是西南地区“金银花”中药材的主要来源,收购以野生品为主,近年来有些地区已引种栽培。

本种的叶下面有一层薄薄的、由细短柔毛组成的毡毛,明显不同于灰毡毛忍冬 *L. macranthoides* Hand.-Mazz. 和异毛忍冬 *L. macrantha* (D. Don) Spreng. var. *heterotricha* Hsu et H. J. Wang 的、由短糙毛组成的毡毛,故易与后两者区别开来。

L. delavayi Franch. 同本种的区别很小,仅仅在于其幼枝、总花梗和花冠外面都无毛或近于无毛。但即使这一点,同本种之间也还存在着许多中间过渡类型,因而 A. Rehder 把它降为本种的一个变种。但值得注意的是,本种植物体的各不同部位毛被之有无,看来并不总是相互联系的。例如,有的幼枝散生刚毛,但花冠却无毛;有的花冠外面有短糙毛和腺毛,但幼枝却全然无毛。鉴于这一情形,把 *L. delavayi* 归并于本种内作为异名也许更为适宜。

92a. 峨眉忍冬(变种)(植物分类学报) 图版 64

Lonicera similis Hemsl. var. *omeiensis* Hsu et H. J. Wang in Acta Phytotax. Sinica 17(4): 82, fig. 10. 1979.

叶下面除密被由短柔毛组成的细毡毛外,还夹杂长柔毛和腺毛。花冠较短,长 1.5—3 厘米,唇瓣与筒几等长。

特产四川西南部、北部、东北部和东部。生于山沟或山坡灌丛中,海拔 400—1700 米。模式标本采自峨眉山伏虎寺。

此变种的花在四川旺苍、江油等县作“金银花”收购入药。

亚属 2. 轮花亚属 Subgen. 2. *Lonicera*

缠绕藤本;枝中空。花序下的 1—2 对叶基部常相连成盘状。花单生,于小枝顶成 1 至数轮,每轮 3—6 花,有花序梗或无;萼齿短小;花柱无毛;子房 3 室。果实红色。

本亚属我国共 6 种。

亚组 13. 红黄花亚组 Subsect. 13. *Phenianthi* (Rafin.) Rehd. Syn. *Lonicera* 166, 1903.

花冠近整齐或稍不整齐,不为唇形,筒比裂片长 3—6 倍。

本亚组我国有 3 种。

93. 贯月忍冬(中国植物图鉴) 穿叶忍冬(东北木本植物图志)

Lonicera sempervirens Linn. Sp. Pl. 173. 1753; DC. Prodr. 4: 332. 1830; Rehd.



峨眉忍冬 *Lonicera similis* Hemsl. var. *omeiensis* Hsu et H.J. Wang; 1. 果枝, 2. 花枝, 3. 双花放大, 4. 苞片、小苞片和花萼放大。(张荣生绘)