

1. 四福花属——*Tetradoxa* C. Y. Wu

C. Y. Wu, 云南植物研究 **3**(4): 384. 1981.

多年生草本,具匍匐近块根状根茎;茎1—2条。基生叶1—3,茎生叶2枚,对生,具柄,叶片3深裂。花茎单一、直立;总状花序顶生和腋生。花黄绿色,具有较长的花柄;花4数,花萼盘状;花冠幅状,花冠筒极短,裂片上密布腺乳突;内轮雄蕊退化成小指状腺体,外轮雄蕊着生于花冠筒檐部,花丝2裂至中部,呈T形,花药单室、盾形、外向、纵裂;子房几上位,心皮4,花柱4,几分离,柱头点状。核果。

属模式种: 四福花 *T. omeiensis* (Hara) C. Y. Wu

本属仅1种,产于我国四川。

1. 四福花(云南植物研究) 图版 1:1—3

Tetradoxa omeiensis (Hara) C. Y. Wu, 云南植物研究 **3**(4): 384. 1981. —
Adoxa omeiensis Hara in Journ. Jap. Bot. **56**(9): 271, f. 1—3. 1981.

多年生无毛、多汁、纤细草本,高10—16厘米;地下茎近块根状(匍匐),上部密被白色肉质鳞片,鳞片腋中抽出纤细丝状匍匐枝。基生叶少数,叶柄基部通常变白增厚。茎单生或有时2条,四棱,上部在花序下着生一对茎生叶。基生叶和茎生叶近同形,绿色,微肉质,轮廓宽卵形,直至近圆形,长宽各约1—3厘米,3裂至中部或以下,裂片长卵形,2—5浅裂,小裂片具极小尖突,叶先端锐尖或多少钝形,基部近截形,圆形或近心形,微下延成短(茎生叶的,长约0.4—2厘米)或长(基生叶的,长达12厘米)柄。花序有限生长,3—5花组成疏总状花序,顶生(稀为从对生的茎生叶叶腋中生出),花柄长约0.5—1厘米。花黄绿色,径5—8毫米;萼盘状,4裂,裂片狭三角披针形,长2—3毫米,果时宿存;花冠近幅状,深4裂,裂片长约2.5—4毫米,狭卵形,先端尾状渐尖,内面密被腺状乳突,基部在中间具乳突状腺体;雄蕊4,着生在花冠管檐部,与花冠裂片互生,长约0.4—1毫米,花丝裂至中部,内弯,向上作T形叉开,花药单室,长0.6毫米;雌蕊4,近于分离,近上位,花柱微外弯,柱头点状。核果。花期5月,果期8月。

产四川峨眉、雅安。生于海拔2300米的林中湿处。模式标本采自四川峨眉山。

2. 五福花属——*Adoxa* Linn.

Linn., Gen. Pl. ed. 5. 172. no. 450. 1754; Benth. et Hook. f., Gen.

Pl. **2**: 2. 1876; K. Fritsch in Engl. u. Pr., Nat. Pflanzenf. **4**(4): 170.

1897; C. Y. Wu et al., 植物分类学报 **19**(2): 203—210. 1981.

多年生矮小草本,具匍匐根茎;茎通常1条。基生叶1—3,茎生叶2枚,对生,具柄,叶片3深裂。花茎单一、直立;聚伞性头状花序顶生。花黄绿色,无柄;花4—5数,花萼浅杯状;花冠幅状,管极短,裂片上乳突约略可见;内轮雄蕊退化成腺状乳突,外轮雄蕊着生