

产河南南部、陕西西南部、安徽、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、贵州和四川。生于海拔(100—)400—1300(—1600)米的山坡草丛或疏林下、溪边、路旁。日本也有。模式标本采自浙江天目山。

本种和攀倒甌 *P. villosa* (Thunb.) Juss. 很相似,以往常被误定为白花败酱,但本种茎密被倒生粗毛,叶两面常有棕褐色或棕红色微腺,花淡黄色,花较小,径2.5—3毫米,花冠有时连同萼筒及小总苞叶有棕红色或棕褐色斑纹和斑点(在放大镜下可见到),能育子房几无毛,翅状果苞卵圆形或卵形,较小,易与后者区别。

本种可药用,性能与攀倒甌相同,浙江昌化民间用它消炎解凝、排脓利尿,广西桂林民间用根浸酒内服治跌打,叶外敷洗疮毒,江西新建民间也用嫩叶作蔬菜食用。

9b. **大斑花败酱**(变种) 萌菜(浙江天台山) 图版7: 7—10

var. **robusta** Hsu et H. J. Wang, 植物分类学报 23(5): 381. 1985.

本变种与斑花败酱(原变种)的不同在于植物体粗壮;茎下部叶多为大头羽状全裂或深裂,顶生裂片卵形,长6—10(—13)厘米,宽3—6.5(—8)厘米;花冠较大,裂片长1.5—2毫米,宽1.1—1.2毫米,冠筒长1.5—1.7毫米,上部宽2.2毫米;子房长0.8—1毫米,宽1毫米;花柱长2.1—2.5毫米。

产江苏南部、浙江、江西、广东西北部和广西东北部、西北部。生于海拔970—1500米的山坡路边草丛中及林下阴处。模式标本采自浙江天目山。

本变种可药用,性能同斑花败酱。浙江天台山民间用全草治阑尾炎。


10. **少蕊败酱**(新拟) 单蕊败酱(中国高等植物图鉴),介头草(四川峨眉山),黄凤仙(四川马尔康),山芥花(河北)

Patrinia monandra C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 210. 1881; 中国高等植物图鉴 4: 327, 图 6067. 1975. — *P. monandra* C. B. Clarke var. *sinensis* Batal. in Acta Hort. Petrop. 13: 377. 1894.

10a. **少蕊败酱**(原变种) 图版8: 1—7

var. **monandra**

二年生或多年生草本,高达150(—220)厘米;常无地下根茎,主根横生、斜生或直立;茎基部近木质,粗壮,被灰白色粗毛,后渐脱落,茎上部被倒生稍弯糙伏毛或微糙伏毛,或为二纵列倒生短糙伏毛。单叶对生,长圆形,长4—10(—14.5)厘米,宽2—4(—9.5)厘米,不分裂或大头羽状深裂,下部有1—2(—3)对侧生裂片,边缘具粗圆齿或钝齿,两面疏被糙毛,有时夹生短腺毛;叶柄长1厘米,向上部渐短至近无柄;基生叶和茎下部叶开花时常枯萎凋落。聚伞圆锥花序顶生及腋生,常聚生于枝端成宽大的伞房状,宽达20(—25)厘米,花序梗密被长糙毛;总苞叶线状披针形或披针形,长8.5厘米,不分裂,顶端尾状渐尖,或有时羽状3—5裂,长达15厘米,顶生裂片卵状披针形,先端短渐尖;花小,花梗基部贴生1卵形、倒卵形或近圆形的小苞片,长1.3—2毫米;花萼小,5齿状;花冠漏斗形,淡



1—6.斑花败酱 *Patrinia punctiflora* Hsu et H. J. Wang var. *punctiflora*: 1.植株上部, 2.茎生叶, 3.果实正面观, 4.果实背面观, 5.花, 6.花冠展开。7—10.大斑花败酱 *P. punctiflora* Hsu et H. H. Wang var. *robusta* Hsu et H. J. Wang: 7.茎生叶, 8.基生叶, 9.果实正面观, 10.果实背面观。(张荣生绘)