

10 月。

产云南蒙自。生于海拔 1300—1400 米的林缘。

2b. 波裂叶刺儿瓜(变种)

var. *sinuato-lobulatum* C. Y. Wu, 植物分类学报 **6**(2): 238. 1957.

与原变种不同之处在于: 叶片外形不规则长方形, 长短于宽, 长 2.5—3.5 厘米, 宽 3—4.5 厘米, 5 浅裂, 上部 3 个裂片的中间裂片三角形, 与两侧裂片近等长或稍长; 花序轴很长, 长达 12 厘米; 花萼和花冠裂片为狭披针形, 长 6—8 毫米, 宽 0.8—1 毫米。

产云南丽江。生于海拔约 1010 米的林下灌丛中。

3. 锥形果属——*Gomphogyne* Griff.

Griff., Pl. Cantor. 26, in adnot., tab. 4. 1837; Cogn. in Engl., Pflanzenz. **66** (IV. 275. 1): 38. 1916; Hutch., Gen. Fl. Pl. **2**: 380. 1967; Keraudren in Aubréville et Leroy, Fl. Cambodge Laos Viêtنام **15**: 22. 1975.

攀援草本; 茎纤细, 具纵棱及槽。叶互生, 具柄, 鸟足状, 具小叶 5—7 枚, 小叶片披针形或长圆形, 具牙齿。卷须单一或常 2 歧。花小, 雌雄同株, 淡绿色。雄花排列成总状花序或圆锥花序; 花萼辐状, 5 裂, 裂片长圆形, 边缘齿蚀状; 花冠辐状, 5 深裂, 裂片长圆状披针形, 常尾状渐尖, 啮蚀状; 雄蕊 5, 花丝短, 基部联合, 花药近球形, 1 室, 直立, 纵裂; 无退化雌蕊。雌花排列成圆锥花序或簇生于叶腋; 花萼与花冠同雄花; 子房下位, 棍棒形或倒圆锥形, 1 室, 花柱 3, 顶端 2 裂; 胚珠 3, 自室顶端下垂; 无退化雄蕊。果实为蒴果, 陀螺形或近三棱状钟形, 具纵肋, 顶端截形, 具冠状宿存花柱 3 枚, 成熟后自顶端裂缝开裂, 通常有种子 1—3 枚。种子椭圆形, 压扁, 具皱纹及乳突, 边缘常具齿。

6 种, 分布于印度、中南半岛和马来西亚。我国 1 种, 分布于云南。

属模式种: 锥形果 *G. cissiformis* Griff.

1. 锥形果

Gomphogyne cissiformis Griff., Pl. Cantor. 26, in adnot., tab. 4. 1837; C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. **2**: 632. 1879; Cogn. in DC., Mon. Phan. **3**: 923. 1881; in Engl., Pflanzenz. **66** (IV. 275. 1): 38. 1916; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine **2**: 1086. 1921; Chakr. in Rec. Bot. Surv. India **17**(1): 184. 1959; Hara, Fl. East. Himal. 322. 1966; Keraudren in Aubréville et Leroy, Fl. Cambodge Laos Viêtنام **15**: 22. 1975; 中国高等植物图鉴 **4**: 348, 图 6110. 1975; C. Jeffrey, Cucurb. East. Asia. **9**. 1980, p. p., excl. syn.——*G. bonii* Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris **24**: 372. 1918.——*G. alleizettii* Gagnep., l. c. **2**: 1086. 1921.

1a. 锥形果 图版 31: 1—2