

较疏。花期 5—9 月,果期 7—11 月。

产贵州东南部至南部、广西东部至东北部、湖南南部。生于海拔 800—1400 米的阔叶林边或山谷疏林下。模式标本采自贵州榕江。

13. 文山雪胆(植物分类学报) 图版 34: 7—8

Hemsleya wenshanensis A. M. Lu ex C. Y. Wu et C. L. Chen, 植物分类学报 23(2): 130. 1985.

多年生草本,具膨大块茎,扁卵圆形。茎草质攀援,被短柔毛老枝近无毛。卷须线形,长 10—20 厘米,先端 2 歧。趾状复叶由 (5—)7—9 小叶组成,叶柄近无毛、长 2.5—4.5 厘米;小叶片矩圆披针形或倒卵状披针形,上面绿色,背面灰绿色,两面疏被短柔毛,先端渐尖,叶基渐狭,边缘细圆锯齿状,中央小叶片长 5—9 厘米,宽 2.5—4.5 厘米,两侧叶片渐小,外侧的略歪斜,小叶柄长 3—6 毫米。花雌雄异株。雄花:聚伞总状花序或圆锥花序,花序轴和小枝曲折,密被短柔毛,长 10—20 厘米;花萼筒短,长约 1 毫米,花萼裂片 5,卵状三角形,先端渐尖,长 4 毫米,宽 3 毫米;花冠碗形,浅黄绿色,径 0.8—1 厘米,裂片 5,倒卵圆形,先端钝圆具小尖突,长 5 毫米,宽 4 毫米,瓣基具成对的深黄色小腺体,内面被糠秕状短柔毛,近基部尤密;雄蕊 5,花丝极短。雌花:子房卵圆形,长 5 毫米,径 3 毫米;花柱 3,柱头 2 裂。果实卵圆形,长 2.2—2.8 厘米,径 1.7—2.5 厘米,密布小疣突,纵纹不明显,花柱基高 2—3 毫米,3 果片,每室具种子 5—6 颗。种子暗棕色,宽卵形至近圆形,长 9 毫米,宽 6 毫米,周生木栓质翅,上下端约宽 1.5 毫米,两侧稍狭;种子本身略膨胀呈双凸透镜状,两面密被乳头状小疣突。花期 6—10 月,果期 7—11 月。

产云南东南部至中南部。生于海拔 1800—2500 米的山谷疏林下。模式标本采自云南文山。

与前种相近,但叶由 (5—)7—9 小叶组成;花较小,径 0.8—1 厘米,花冠裂片基部具成对的黄色小腺体;果实卵圆形,密布细疣点而不同。

14. 大序雪胆(植物分类学报)

Hemsleya megathyrsa C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen, 植物分类学报 23(2): 131. 1985.

14a. 大序雪胆(原变种) 图版 34: 1—3

var. **megathyrsa**

多年生攀援草本,具膨大块茎。茎和小枝细弱,疏被短柔毛,老时近无毛。卷须被疏柔毛,长 10—24 厘米,先端 2 歧。趾状复叶由 (—5)7—9 小叶组成,叶柄粗壮,长 3—6.5 厘米;小叶片长圆披针形或倒卵状披针形,纸质,上面深绿色,背面灰绿色,先端渐尖,基部渐狭,边缘疏圆锯齿状,主要沿中脉、侧脉和叶缘疏被小刺毛,其余近光滑无毛;中央小叶长 7—15 厘米,宽 2—4 厘米,两侧小叶渐小,小叶柄长 5—10 毫米。花雌雄异株,雌雄花序均为密集的聚伞圆锥花序,总花梗纤细,曲折,长 13—20 厘米,少数长达 40 厘米,整个花



1—3.大序雪胆 *Hemaleyia megathyrsa* C. Y. Wu ex C. Y. Wu et C. L. Chen var. *megathyrsa*:
 1.果枝, 2.雄花, 3.种子。4—6.丽江雪胆 *H. lijiangensis* A. M. Lu ex C. Y. Wu et C. L. Chen:
 4.雄花, 5.果实, 6.种子。7—8.文山雪胆 *H. wenshanensis* A. M. Lu ex C. Y. Wu et C. L.
 Chen: 7.果实, 8.种子。(李锡畴绘)