

条,花柱基高4毫米,果柄稍偏斜,长9—12毫米,果皮新鲜时厚3—4毫米,3果片,每室具种子6—10。种子倒卵状椭圆形至近圆形,暗棕色,长1.3—1.6厘米,宽1.2—1.4厘米,周生木栓质翅,上下端翅宽4—5毫米,两侧为2—3毫米,具不规则皱褶;种子本身近圆形,稍扁,两面边缘密生小乳头状突起,中间疏布小瘤突。花期6—10月,果期8—11月。

产云南东南部、贵州西部。生于海拔1800—1900米疏林下或山谷灌丛中。模式标本采自云南罗平移植至昆明植物研究所栽培植株。

花的构造与本组其他种相近,但植物外形完全不同,果卵圆形,具10条肋,密被白色细瘤突。

#### 16. 彭县雪胆(植物分类学报)

*Hemsleya pengxianensis* W. J. Chang, 植物分类学报 17(4): 97, 图 1. 1979.

##### 16a. 彭县雪胆(原变种)

var. *pengxianensis*

多年生草质藤本,具膨大块茎,扁球形,断面淡黄白色,微苦。小枝纤细,疏被短柔毛,老枝近光滑无毛。卷须线形,先端2歧。趾状复叶由(3—)5—7小叶组成,叶柄长4.5—7厘米,近无毛,小叶片倒卵状披针形至狭椭圆状披针形,膜质,上面绿色,背面灰绿色,先端急尖或尾状渐尖,基部渐狭,小叶柄长3—5毫米,叶缘疏圆锯齿状,齿裂深2—3毫米,沿中脉、侧脉及叶缘疏生细刺毛,其余光滑无毛,中央小叶片长8—17厘米,宽2—4厘米,两侧叶片渐小。花雌雄异株,聚伞总状花序,总花序梗长4—10厘米,曲折,密被短柔毛。雄花:花萼裂片5,披针形,长4毫米,宽2—3毫米;花冠黄绿色,盘状,径0.6—0.8厘米,草质,裂片卵圆形,长6毫米,宽4毫米,先端圆钝具小尖突,向后反折。雌花:子房近球形,径3毫米,具柄,长约3毫米;花柱3,柱头2裂。果实卵状球形,长3—4厘米,径3—3.5厘米,平滑,具10条纵棱,微凸起,3果片,具种子10余枚。种子近圆形,径1—1.3厘米,周生宽2—3毫米的木栓质翅,一侧稍狭,略具皱褶;种子本身卵形至近圆形,肿胀,周生小瘤突,中间部分近平滑。花期6—9月,果期8—11月。

产四川中部。生于海拔1500米左右的林缘及山谷灌丛中。模式标本采自四川彭县。

##### 16b. 筠连雪胆(植物分类学报) (变种)

var. *junlianensis* L. T. Shen et W. J. Chang, 植物分类学报 21(2): 188. 1983.

叶柄密被短柔毛,小叶边缘具小圆齿;花序轴、花梗及花冠被稀疏的短柔毛;子房卵形而与原变种相区别。

产四川南部。生于海拔1500米的林缘灌丛中。模式标本采自四川筠连。

##### 16. 古蔺雪胆(植物分类学报) (变种)

var. *gulinensis* L. T. Shen et W. J. Chang, 植物分类学报 21(2): 188, 图 3: 6—