

2: 4—7. 1983.

多年生攀援草本,根块茎状膨大,断面黄色,稍苦。枝纤细,具深槽及被疏柔毛,趾状复叶由3—5小叶组成,叶柄长2—5厘米;小叶片卵状披针形,顶端急尖或渐尖,基部楔形,边缘锯齿状,小叶柄长3—5毫米;中央小叶长9—12(—20)厘米,宽3.5—4.5—6厘米,两侧小叶渐小,有时末端小叶深裂至基部。卷须线形,先端2歧。花雌雄异株。雄花在圆锥花序上排列稀疏,花序轴长10—12厘米,花梗线形,长0.8—2厘米;苞片极小,钻形;花萼裂片5,披针形,长1厘米,宽0.3厘米,反折,被疏柔毛;花冠浅黄绿色,成不规则的球形,径0.9—1.1厘米,裂片宽卵状披针形,长1—1.5厘米,宽0.6—1厘米,反折;雄蕊5,花丝极短,长约1毫米。雌花:花冠较大,径1.2—1.5厘米;子房卵球形,长1厘米,径0.5厘米,花柱3,柱头2裂。果椭圆体形,顶端平截,基部钝圆,密布细瘤突,长3.5—4厘米,径2.5厘米,具10条纵稜,果皮厚革质。种子近圆形,径1.5厘米,灰黄色(未完全成熟);周生木栓质翅,宽3—4毫米,上端具不规则齿缺,下端具皱褶;本身肿胀,边缘密生小瘤状突起,中间部分疏布小瘤突。花期7—9月,果期9—11月。

产四川峨眉山。生于海拔1500—2000米林缘灌丛中。模式标本采自四川峨眉山。

组4. 雪胆组——Sect. *Hemsleya* C. Y. Wu et C. L. Chen, 植物分类学报 **23**(2): 137. 1985.

花冠淡黄色至橙红色,反折或反卷,内面通常被长毛或糠秕状毛,花冠成盘状,灯笼状或陀螺状;种子翅退化,在1.5毫米以下。

23. 雪胆(中国高等植物图鉴)

Hemsleya chinensis Cogn. ex Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 490. 1888, et in Hook., Ic. Pl. 9: ser. 3. t. 1822. 1889, p. p., et Engl. Pflanzenr. **66** (IV. 275. 1): 23. 1916, p. p., quoad flores masculos, et flores foemineos, excl. fructus et semen; 周太炎、裴鉴,中国药用植物志 **7**: f. 349. 1964, excl. f. 3—8; 中国高等植物图鉴 **4**: 344. 图 6102. 1975, p. p. quoad flores masculos et foemineos, excl. fig. fructus et semen.——*Gymnostemma* sp. nov. Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 321. 1888.——*Hemsleya szechuenensis* Kuang et A. M. Lu, 中国高等植物图鉴 **4**: 345. 图 6103. 1975, p. p. quoad semen, excl. fl. masc. et fr.; 路安民,植物分类学报 **20**(1): 88 图 2: 1—8. 1982, descr. latin. republ., p. p., quoad fl. fem. & fl. masc. et sem. excl. fr.

23a. 雪胆(原变种)(植物分类学报) 图版 36: 1—3

var. ***chinensis***

多年生攀援草本。茎和小枝纤细,疏被短柔毛,老枝平滑近无毛,通常近茎节处被毛较密。卷须线形,长8—14厘米,疏被短柔毛,先端2歧。趾状复叶由5—9小叶组成,多