

1828; Miq., Fl. Ind. Bat. **1**: 682. 1856; C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. **2**: 633. 1879; Cogn. in DC., Mon. Phan. **3**: 926. 1881, et in Engl., Pflanzenr. **66**(IV. 275. 1): 27. 1916; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 1082. 1921; Chakr. in Rec. Bot. Surv. India **17**(1): 181. 1959; Back. et Bakh. f., Fl. Java. **1**: 295. 1963; Keraudren in Auréville et Leroy, Fl. Cambodge Laos Viétnam **15**: **15**. pl. 4, 1975. — *Alsomitra simplicifolia* Merr. in Philip. Journ. Sci. **20**: 470. 1922. — *Juppia borneensis* Merr. in Journ. As. Soc. Straits **85**: 170. 1922.

1a. 翅子瓜(原变种)

var. *indica*

茎粗壮,多分枝,多少具纵棱及槽,无毛。单叶互生,叶片革质,卵状长圆形,长8—16厘米,宽5—10厘米,先端急尖,基部圆形或稍微凹,全缘,上面平滑,背面网状,两面无毛,侧脉3—4对,弧曲上升,网结,在背面隆起,细脉网状;叶柄长1.5—3厘米,无毛。卷须稍粗,延长,无毛。花雌雄异株。雄花排列成圆锥花序,总花梗细,长约16厘米,多分枝,无毛或被微柔毛,花梗粗壮,长4—5毫米,中部具关节;花萼裂片卵状三角形,长2毫米,急尖,无毛;花冠淡黄褐色,裂片长圆形,长3—3.5毫米,宽1—1.5毫米,先端钝。雌花总梗长10—30厘米,具稀疏的5—10花,花梗粗壮,极短;花萼裂片长4毫米,花冠裂片长6—8毫米;子房倒圆锥状圆柱形,长10—12毫米。果实暗棕色,长6—10厘米,宽2.5—3厘米,先端平截,基部钝,表面具细颗粒。种子长圆形,长约2厘米,宽约1厘米,淡黄褐色,周围围以淡黄色的膜质翅,翅长5—6厘米,宽约1.3—1.5厘米,两端圆形。

产印度、斯里兰卡、锡金、孟加拉国、缅甸、中南半岛、泰国、马来西亚、加里曼丹岛和菲律宾。我国产广西(那坡)。生于海拔285米的河边、山坡。

1b. 滇南翅子瓜(变种)

var. *pubescens* Cogn. in DC., Mon. Phan. **3**: 927. 1881; Chakr. in Rec. Bot. Surv. Ind. **17**(1): 184. 1959.

本变种与翅子瓜(原变种)的主要区别在于果实宽大,且密被短柔毛,长10厘米,宽4.5—5厘米;种子长2厘米,宽约1.5厘米,翅乳白色,长约8厘米,宽约2厘米。

产云南南部(勐腊),生于海拔810米的疏林中及干燥沟谷边缘。印度北部(阿萨姆)亦有。

3. 藏瓜亚族——Subtrib. FEVILLINAE Pax

Pax in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenf. IV, **5**: 10. 1889; Hutch., Gen. Fl. Pl. **2**: 383. 1967.

子房3室,花柱1,胚珠下垂生,附着于子房室的腋部;果实较大,不开裂;种子大。

3属,我国1属。