

7. 藏瓜属——*Indofevillea* Chatterjee

Chatterjee in Nature **158**: 345. 1946, et in Kew Bull. **1947**: 119—121.

1947; Chakr. in Rec. Bot. Surv. Ind. **17**(1): 129. 1959.

木质藤本，茎攀援状，具有纵向棱沟。叶具柄，叶片卵状心形，全缘，具掌状叶脉，卷须粗壮，2 歧。雌雄异株；雄花序圆锥状，总梗伸长，花梗短；苞片线形，渐尖；花萼裂片 5，急尖，具 3 脉；花冠裂片 5，较花萼裂片短，具 3—5 条脉；雄蕊 5，4 枚成对靠合，1 枚分离，花丝几无，花药肾形，全部 1 室，有柔毛。退化雌蕊缺。雌花未见。果实长圆形，不开裂，3—6 个成簇生于长果梗上，果皮较厚，近木质，具多数种子。种子扁压，卵形。

1 种，分布于印度东北部和我国西藏南部（墨脱）。本属接近赤爬属 *Thladiantha*，区别在于该属花萼裂片比花冠裂片长，花无鳞片，花药肾形，几无花丝，退化雌蕊缺如，果实较大，长超过 10 厘米。

属模式种：藏瓜 *I. khasiana* Chatterjee

## 1. 藏瓜

*Indofevillea khasiana* Chatterjee in Kew Bull. **1947**: 119—121. 1947; Chakr. in Rec. Bot. Surv. Ind. **17**(1): 129. 1959.

攀援藤本；茎木质，枝粗壮，具棱沟，粗糙，幼时被长柔毛，后渐脱落变光滑无毛。卷须稍粗壮，光滑无毛，长达 20—30 厘米，2 歧。叶柄粗壮，长 1.5—8 厘米，径 0.8 厘米，初时密被柔毛，老后变光滑无毛；叶片革质，宽卵状心形，长 15—25 厘米，宽 12—20 厘米，全缘或幼嫩时基部有细齿，老后边缘皱波状，先端有长约 1 厘米的短尖头，两面光滑，叶脉稍凸起，与叶柄一样，初时有柔毛，老后渐脱落。花雌雄异株。雄花序圆锥状，长达 17 厘米，总花梗和分枝均粗糙；苞片线形，渐尖，长 5—9 毫米，小苞片长 2—3 毫米；花萼裂片 5，卵状披针形，具 3—4 条脉，比花冠裂片长，长约 6 毫米；花冠裂片 5，卵状披针形，明显具 3—5 条脉，外面微被柔毛，内面具乳头状突起，长约 4 毫米；雄蕊 5，两两成对（但不连合），1 枚离生，花丝几无；花药 1 室，肾形，有毛。无退化雌蕊。果实长圆形，3—6 个成簇生在长柄上，长约 30 厘米，果皮较厚，近木质，外面光滑无毛，具多数种子。种子卵形，扁压，边缘拱起，长约 3.5—4 厘米，宽约 2 厘米，厚 0.5 厘米。花、果期 8 月。

产西藏东南部（墨脱）。生于海拔 900 米左右的山坡杂木林中。分布于印度东北部。

4. 赤爬亚族——Subtrib. *THLADIANTHINAE* Pax

Pax in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenf. IV, **5**: 13. 1889; Cogn. in Engl., Pflanzenr. **66**(IV. 275. 1): 40. 1916; C. Jeffrey in Kew Bull.

**15**(3):339. 1962, p. p.; Hutch., Gen. Fl. Pl. **2**:284. 1967.

子房具 3 胎座，花柱柱状，胚珠多数，水平生；果实不开裂，浆果状；种子无翅或极稀有