

不及1厘米,花较小,花冠裂片长约1厘米。

产云南。生于海拔950—2300米的山坡灌丛、林缘或林下。印度半岛东北部、中南半岛也有。

14c. **五叶赤鼈**(变种) 山土瓜(云南)

var. **pentadactyla** (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang. 植物研究 **1**(1—2): 80. 1981. — *T. pentadactyla* Cogn. in Engl., Pflanzenr. **66**(IV. 275. 1): 52. 1916. — *T. hookeri* C. B. Clarke var. *palmatifolia* Chakr. f. *quinquefoliata* Chakr. in Nat. Edinb. **22**. no. **48**: 122. 1948, et in Rec. Bot. Surv. Ind. **17**(1): 129. 1959.

叶通常为鸟足状5小叶,稀为指状7小叶,小叶片狭长圆形、宽披针形或披针形,中间1枚长8—15厘米,宽1.5—3厘米,其余的较小,雄花通常3—5朵生于疏散的花序上或稀单生,花梗丝状,长3—6厘米,花较大,花冠裂片长1.5—2厘米。

产云南、贵州。生于海拔1800—2900米的沟边及林下。

本变种块根入药,有消炎解毒、润肺止咳的功效。

14d. **七叶赤鼈**(变种) 山土瓜(云南)

var. **heptadactyla** (Cogn.) A. M. Lu et Z. Y. Zhang in 植物研究 **1**(1—2): 81. 1981. — *T. heptadactyla* Cogn. in Engl., Pflanzenr. **66**(IV. 275. 1): 52. 1916. — *T. digitata* Lévl., Cat. Pl. Yunnan. **65**. 1916.

叶通常为鸟足状7小叶,稀3—5小叶,小叶线形,线状披针形或狭披针形,中间小叶长6—10厘米,宽0.5—1厘米。雄花多单生或2—4朵生于疏散的总状花序上;花大,花冠裂片长2—2.5厘米。

产云南、贵州。生于海拔1400米的杂木林中。

15. **山地赤鼈**(植物研究) 图版40: 9—10

Thladiantha montana Cogn. in Engl., Pflanzenr. **66**(IV. 275. 1): 48. 1916.

攀援草本,除叶面幼时生短刚毛外,全体几无毛。茎、枝有纵向棱沟。叶柄细,长8—10厘米;叶片近膜质或薄纸质,卵状心形或宽卵状心形,长10—16厘米,宽8—12厘米,先端渐尖,基部心形,弯缺近圆形,有时叶片基部向后靠合,边缘有胼胝质的细齿,上面深绿色,密布由于刚毛断裂而存留的白色疣状糙点(触摸时甚为粗糙),叶背色浅。卷须稍粗壮,2歧。雌雄异株。雄花:花序总状或多分枝呈圆锥状,具5—10朵花,有时在同一叶腋内生2—4个花序,花序轴细,长6—10厘米;花梗纤细,长0.5—1厘米;花萼筒浅杯状,上部宽4—5毫米,长约3毫米,裂片三角状披针形,长约4毫米,宽1毫米,1脉,先端稍钝;花冠黄色,裂片狭长卵形,长0.8—1.2厘米,宽约0.5厘米,先端渐尖,具5脉;雄蕊5,插在花萼筒下部,花丝基部两两靠近而成对生,1枚离生,花丝疏生柔毛,长2—3毫米,花药长圆形,长2毫米;退化雌蕊近球形,色暗,径约2毫米,基部有3片不等大黄色鳞片。雌花:单生,稀2—3朵生于一短的总梗上,总梗粗壮,长约1—2.5厘米;花梗稍细,