

分布于四川、湖北、安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州和云南。常生于海拔 500—1600 米的林中阴湿处以及路旁、田边及灌丛中。日本、朝鲜、越南、印度半岛、印度尼西亚(爪哇)菲律宾等也有。

全草药用,有清热、利尿、消肿之效。

2. 云南马陵儿(新拟) 图版 45: 8

Zehneria marginata (Bl.) Keraudren in Aubréville et Leroy, Fl. Cambodge Laos Viêtنام **15**: 55. 1975. — *Bryonia marginata* Bl., Bijdr. 924. 1826; Ser. in DC., Prodr. **3**: 305. 1828. — *Melothria marginata* (Bl.) Cogn. in DC., Mon. Phan. **3**: 593. 1881, et in Engl., Pflanzenr. **66**(IV. 275. 1): 93. 1916.


一年生攀援草本;茎、枝无毛,有棱沟。叶柄纤细,长 2—3.5 厘米,有白色硬毛;叶片膜质,卵状心形或长圆状戟形,常 3 中裂,长 6—10 厘米,宽 4—10 厘米,中间的裂片较大,窄三角形或披针状三角形,长 5—7 厘米,宽 1.5—2.5 厘米,顶端急尖,侧裂片较小,三角形,长 2.5—3.5 厘米,宽 2—2.5 厘米,顶端稍钝,边缘由于叶脉延伸而有极细的胼胝状小齿,基部近截平或稍微凹,两面粗糙,有白色的刚毛,尤以脉上较密。卷须单一,纤细,有柔毛。雌雄同株。雄花:常 5—15 朵花生于 4—6 厘米长的总状花序上,花梗长仅 2—6 毫米,与花序梗一样,有微柔毛;花萼筒窄钟形,有硬毛,长 1 毫米,宽 1—5 毫米,基部圆,裂片近钻形,长 0.3—0.5 毫米;花冠黄色,有柔毛,裂片卵状三角形,长仅 1 毫米;花药窄,无毛,药隔不伸出;退化雌蕊腺体状。雌花:单生于叶腋;花梗丝状,长 3—4 厘米;花萼和花冠同雄花;子房窄长圆形,有微柔毛;花柱短,柱头膨大。果梗纤细,长 3—4 厘米,无毛;果实卵形或近球形,长 1.5—1.8 厘米,径 0.5—1.2 厘米,基部稍钝或渐狭。种子卵形,长 4 毫米,宽 2.2 毫米,厚 1 毫米,基部钝圆,两面具细凹穴,边缘增厚。

产云南。常生于海拔 600—800 米左右的山坡路旁疏林中。中南半岛和印度尼西亚也有。

3. 锤果马陵儿(新拟)

Zehneria wallichii (C. B. Clarke) C. Jeffrey in Kew Bull. **34**: 802. 1980. — *Melothria wallichii* C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. **2**: 626. 1879; Cogn. in DC., Mon. Phan **3**: 592. 1881, et in Engl., Pflanzenr. **66**(IV. 275. 1): 91. 1916; Chakr. in Rec. Bot. Surv. Ind. **17**(1): 156. 1959.

纤细草本;茎、枝无毛。卷须丝状,无毛,不分歧。叶柄细,疏被白色短硬毛,长 3—4 厘米;叶片薄膜质,宽卵形或三角形,长、宽均为 6—7 厘米,上面亮绿色,较粗糙,有白色小疣点,背面苍绿色,除脉上具稀疏短硬毛外,几乎无毛,先端急尖,基部截平或具深仅 0.5 厘米的弯缺,边缘微波状或具极小稀疏小齿,脉掌状。雌雄同株。雄花:常 7—10 朵生于总状花序上或在叶腋内单生,花序轴丝状,被短柔毛,长 1—2 厘米,花梗细,长 0.5—1 厘米;花萼筒宽钟形,无毛,长 1—2 毫米,宽 2 毫米,裂片近钻形,长约 0.5 毫米;花冠黄白



1—7. 马陵儿 *Zehneria indica* (Lour.) Keraudren: 1. 花果枝, 2、3、4. 不同的叶形, 5. 花冠展开的雌花, 6. 花冠展开的雄花, 7. 种子。8. 云南马陵儿 *Z. marginata* (Bl.) Keraudren: 叶。9—11. 扭子瓜 *Z. maysorensis* (Wight et Arn.) Arn.: 9. 花果枝, 10. 花冠展开的雄花, 11. 种子。(吴影桦绘)