

径3—4厘米,基部和顶端渐狭,外面密被柔软的长刺。种子灰色,卵圆形或圆球形,长7毫米,厚4毫米,两面稍有刻纹。花期6—8月,果期8—10月。

产云南、贵州、广东、广西。常生于海拔800—1500米的山坡、路旁阴处。缅甸、老挝、越南、马来西亚和印度尼西亚也有。

3. 云南木鳖(新拟) 图版49: 6—7


Momordica dioica Roxb. ex Willd., Sp. Pl. **4**: 605. 1805; Cogn. in DC., Mon. Phan. **3**: 441. 1881; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 315. 1887; Cogn. u. Harms in Engl., Pflanzenr. **88** (IV. 275. 2): 32. 1924; Chakr. in Rec. Bot. Surv. Ind. **17**(1): 91. 1959.

攀援草本,具块状根;茎、枝纤细,有沟纹,光滑无毛。叶柄细,长5—8厘米,无腺体;叶片卵状心形,膜质,长9—13厘米,宽7—11厘米,浅波状或不规则3—5浅裂,稀不分裂,边缘有稀疏的粗齿,先端急尖,基部心形,弯缺较深,叶脉掌状,叶面绿色,初时有稀疏的短柔毛,脉上被黄褐色柔毛,后渐脱落,变近无毛,叶背浅绿色,有稀疏的腺点。卷须丝状,无毛,不分歧。雌雄异株。雄花:单生于叶腋,花梗纤细,无毛,有沟纹,长8—14厘米,顶端生一黄绿色的叶状苞片;苞片膜质,无柄,圆肾形,兜状,长2—2.5厘米,宽2.5—3.5厘米,两面有极稀疏的柔毛,具缘毛;花萼密被长柔毛,裂片披针形,长8—9毫米,宽4—5毫米,具1脉,先端急尖;花冠淡黄色,裂片长圆形,长3—3.5厘米,宽2—2.5厘米,先端钝;雄蕊3,2枚2室,1枚1室,药室2回折曲。雌花:单生于叶腋,花梗纤细,长6—10厘米,有时基部有一苞片,后脱落;花萼与花冠同雄花;子房卵状长圆形,长0.8厘米,径0.3厘米,基部渐狭,外面有乳头状凸起。果实卵形或宽卵形,长3—5厘米,径2—2.5厘米,粗糙,有瘤状凸起。种子长圆形,黄褐色,边缘不拱起,两面有不规则的雕纹,长10—14毫米,宽6—8毫米,厚5毫米。花期6—8月,果期8—11月。

产云南。生于海拔1400—2500米的山坡路旁及灌木丛中。印度、马来西亚、缅甸、孟加拉也有。

4. 木鳖子(开宝本草) 番木鳖(中国经济植物志),糯米果(云南河口),老鼠拉冬瓜 图版49: 8—12

Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng., Syst. Veg. **3**: 14. 1826; Cogn. in DC., Mon. Phan. **3**: 444. 1881; Franch., Pl. David. **1**: 135. 1884; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 315. 1887; Cogn. u. Harms in Engl., Pflanzenr. **88**(IV. 275. 2): 34. 1924; Hand. -Mazz., Symb. Sin. **7**: 1064. 1936; Chakr. in Rec. Bot. Surv. Ind. **17** (1): 95. 1959; Keraudren in Aubréville et Leroy, Fl. Combodge Laos Viêtنام **15**: 38. 1975; 陈焕镛主编,海南植物志, **1**: 473. 1964; 中国高等植物图鉴 **4**: 359, 图6132. 1975. —*Muricia cochinchinensis* Lour., Fl. Cochinch. 596. 1790. —*Momordica mixta* Roxb., Hort. Beng: 70. 1814. nom. illegit. superfl.; Hook. in Bot. Mag. **85**: t. 5145.



1—5.凹萼木鳖 *Momordica subangulata* Bl.: 1.雌花枝, 2.雄花, 3.雄蕊, 4.果实, 5.种子。
 6—7.云南木鳖 *M. dioica* Roxb. ex Willd.: 6.叶, 7.雌花。8—12.木鳖 *M. cochinchinensis* (Lour.) Spreng.: 8.雄花枝, 9.雌花, 10.果实, 11.种子正面观, 12.种子侧面观。
 (吴彰桦绘)