

我国各地普遍栽培,且许多地区均有温室或塑料大棚栽培;现广泛种植于温带和热带地区。

果为我国各地夏季主要菜蔬之一。茎藤药用,能消炎、祛痰、镇痉。

3b. 西南野黄瓜(变种)

var. **hardwickii** (Royle) Alef., Landwirthsch. Fl. 196. 1866.——*C. hardwickii* Royle, Ill. Himal. 220. t. 47, f. 3. 1835; Cogn. u. Harms in Engl., Pflanzenr. **88**(IV. 275. 2): 143. 1924.

与原变种的区别在于果实较小,长圆形或近球形,长5—6厘米,径4—5厘米,外面平滑,无瘤状突起。

产云南、贵州和广西。常生于海拔700—2000米的山坡、林下、路旁及灌丛中。印度东北部、尼泊尔、缅甸、泰国也有。

4. 野黄瓜 酸黄瓜、鸟苦瓜(云南屏边、勐海),老鼠瓜(云南景洪) 图版 53

Cucumis hystrix Chakr. in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. **50**: 896; 1952; et in Rec. Bot. Surv. Ind. **17**(1): 110. 1959.——*C. muriculatus* Chakr. in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. **50**: 896. 1952, et in Rec. Bot. Surv. Ind. **17**(1): 110. 1959.

一年生攀援草本,全体被白色糙硬毛和短刚毛。茎、枝纤细,多少有分枝,粗糙,有棱沟。叶柄稍粗糙,长6—10厘米;叶片厚膜质,宽卵形或三角状卵形,长6—13厘米,宽6—10(—12)厘米,常不规则地3—5浅裂或稀不分裂,边缘有小齿,裂片三角形,顶端急尖,基部心形,弯缺半圆形,深1.5—2厘米,宽1—1.5厘米,上面深绿色,下面灰绿色,掌状五出脉。卷须纤细,不分歧。雌雄同株。雄花:单生或由于总花梗极短或近无而呈簇生;花萼筒狭钟状,长6毫米,宽2毫米,裂片线形,长1—2毫米;花冠黄色,裂片卵状长圆形,长5—6毫米,宽3—4毫米,先端稍急尖;雄蕊3,花丝纤细,长仅1毫米,被稀疏柔毛,花药长2毫米,药室折曲。雌花:单生;花梗长5毫米;花萼和花冠同雄花;花冠长6—10毫米;子房长圆状卵形,长1厘米,径0.4厘米,极粗糙,密被黄褐色的硬毛,花柱长2—3毫米,柱头3裂,分裂部分顶端钝圆,长3毫米。果梗长约0.5—1厘米;果实长圆形,长4—5厘米,径1.5—2.3厘米,外面粗糙,密生长达2毫米的具刺尖的瘤状突起。种子狭卵形,长3—4毫米,中部宽2毫米,两面光滑,边缘不拱起。花期6—8月,果期8—9月。


产云南西部。常生于海拔780—1550米的山谷、河边、阴湿处、林下及灌丛中。印度东北部、缅甸也有。

21. 毒瓜属——**Diplocyclos** (Endl.) Post et Kuntze

Post et Kuntze, Lex. 178. 1903; C. Jeffrey in Kew Bull. **15**: 354.

1962.——*Bryonia* Linn. Sect. *Diplocyclos* Endl., Prodr. Fl. Norfolk. **1**:

68. 1833.——*Ilocania* Merr. in Philip. Journ. Sc. Bot. **13**: 65. 1918.



野黄瓜 *Cucumis hystrix* Chakr.: 1.花枝, 2.雌花, 3.柱头和花柱, 4.果实, 5.种子。(张泰利绘)