

截。 花期 7—8 月,果期 8—9 月。

产云南西南部和广西南部。生于海拔 1700 米的森林中。模式标本采自云南镇康。

亚组 2. 趾叶亚组——Subsect. *Pedatae* (C. Y. Cheng et Yueh) C. Jeffrey, *Cucurb. East. Asia* 43. 1980.——Sect. *Pedata* C. Y. Cheng et Yueh, *植物分类学报* 12(4): 444. 1974.

叶为趾状复叶,具小叶 3—5 枚;雄花苞片菱状披针形,边缘锐裂或具牙齿。

13. 趾叶栝楼(海南植物志)

Trichosanthes pedata Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 20. 1934; 陈焕镛等, 海南植物志 1: 481. 1956; 乐崇熙、诚静容, 植物分类学报 12(4): 444, 图版 87, 图 4; 图版 88, 图 29. 1974; Keraudren in Aubréville et Leroy, *Fl. Cambodge Laos Vietnam* 15: 91. 1975. ——*T. pedata* Merr. et Chun var. *yunnanensis* C. Y. Cheng et Yueh, l. c. 12(4): 445, 图 9, 1974.

草质藤本,攀援;茎细,具纵棱及槽,无毛或仅节上被短柔毛。指状复叶具小叶 3—5 片;叶柄长 2.5—6 厘米,具纵条纹,无毛;小叶片膜质或近纸质,中央小叶常为披针形或长圆状倒披针形,长 9—12 厘米,宽 2.5—3.5 厘米,两端渐尖,边缘具疏离细齿,外侧两片近于菱形或不等侧的卵形,上面幼时被短硬毛,后变为白色圆糙点,背面淡绿色,无毛,具颗粒状突起,主脉和侧脉在上面稍凹,密被短柔毛,背面凸起,具白色圆糙点,细脉网状;小叶柄长 2—5(—11) 毫米,上面被短柔毛。卷须长而细弱,具条纹,2 歧。雄总状花序长 14—19 厘米,总花梗及花梗被褐色短柔毛,具纵槽纹,中部以上有花 8—20 朵;苞片倒卵形或菱状卵形,长 10—15 毫米,宽约 8 毫米,被短柔毛,先端渐尖,基部渐狭,中部以上撕裂或具不规则的锐齿;花梗长 4 毫米;花萼筒狭漏斗形,长 2—4 厘米,上部径 7—10 毫米,裂片披针形,长 7—10 毫米,宽 2—3.5 毫米,先端渐尖,全缘或具裂齿;花冠白色,裂片倒卵形,长 10—15 毫米,宽 8—12 毫米,先端具流苏;花药柱长 7 毫米,宽 4 毫米,药隔有毛。雌花单生,萼筒圆柱形,长约 3 毫米,径约 5 毫米,萼齿和花冠同雄花;子房卵形,长 1.5 厘米,径 8 毫米,无毛。果实球形,径 5—6 厘米,橙黄色,光滑无毛;果柄长 1(—3) 厘米。种子卵形,臃胀,灰褐色,长 10—12 毫米,宽约 8 毫米,顶端圆形,种脐压扁,三角形,无边棱及线。 花期 6—8 月,果期 7—12 月。

产江西(寻乌)、湖南(江永)、广西、广东和云南。生于海拔 200—1500 米的山谷疏林中、灌丛或路旁草地中。分布于越南。

14. 木基栝楼(植物分类学报)

Trichosanthes quinquefolia C. Y. Wu ex C. Y. Cheng et Yueh, *植物分类学报* 18(3): 351, 图 7, 图版 6: 19. 1980.

草质藤本;茎圆柱形,具纵条纹,除节上被短柔毛外,余无毛。指状复叶具 3—5 小叶;