

产甘肃东南部、陕西南部、湖北西南部、四川东部、贵州、云南东北部、江西(寻乌)。生于海拔 400—1850 米的山谷密林中、山坡灌丛中及草丛中。模式标本采自四川南川。

本种的叶形、雄花或单生、总状花序或两者并生，以及小苞片等性状均似栝楼 *T. kirilowii* Maxim; 但后者的叶常掌状 3—7 浅裂或中裂，裂片菱状倒卵形，常常再分裂，稀不分裂；小苞片较大，长 15—25(—30) 毫米，宽 10—20 毫米；花萼裂片披针形；种子棱线近边缘。

本种的根和果实均作天花粉和栝楼入药。

24b. 多卷须栝楼(变种)

var. **multicirrata** (C. Y. Cheng et Yueh) S. K. Chen, comb. nov. — *T. multicirrata* C. Y. Cheng et Yueh, 植物分类学报 **12**(3): 430, 图版 83, 图 4; 88, 图 14. 1974. — *T. damiaoshanensis* C. Y. Cheng et Yueh, l. c. **18**(3): 346. 1980.

本变种与中华栝楼(原变种)的主要区别在于叶片较厚，裂片较宽大，卷须 4—6 歧，被长柔毛，花萼筒短粗，长约 2 厘米，顶端径约 1.3 厘米，密被短柔毛。

产广西、广东北部、贵州和四川。生于海拔 600—1500 米的林下、灌丛中或草地。模式标本采自广西平南。

本变种的根、果也作天花粉及栝楼入药。

24c. 糙籽栝楼(变种)

var. **scabrella** (Yueh et D. F. Gao) S. K. Chen, comb. nov. — *T. scabrella* Yueh et D. F. Gao, 植物分类学报 **18**(3): 345, 图 4; 图版 6: 11. 1980.

本变种与中华栝楼(原变种)及多卷须栝楼的区别是其果实较大，长 12—16 厘米，径 6.5—8.5 厘米，种子长 20—22 毫米，宽 12—14 毫米，厚 3—3.5 毫米，表面粗糙，具细皱纹。

产四川西部。模式标本采自四川大邑。

24d. 黄山栝楼(变种)

var. **huangshanensis** S. K. Chen, 植物研究 **5**(2): , 116. 1985.

本变种与中华栝楼(原变种)的主要区别在于叶片 5 深裂至基部，裂片具 1—2 线形细裂片。

产安徽黄山。生于中海拔的山坡灌丛中。模式标本采自安徽歙县黄山。

25. 栝楼 瓜蒌、瓜楼、药瓜

Trichosanthes kirilowii Maxim., Prim. Pl. Amur. 482. 1859, in nota; Cogn. in DC., Mon. Phan. **3**: 370. 1881; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 313. 1888; Diels in Engl., Bot. Jahrb. **29**: 603. 1901; Nakai, Fl. Kor. **1**: 249. 1909; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**: 1065. 1936; Kitamura et Yoshida in Journ. Jap. Bot. **19**(1.2): 27. 1943; 乐崇熙、诚静容, 植物分类学报 **12**(4): 428, 图版 83, 图 1; 88, 图 11. 1974; 中国高等植物图鉴 **4**: 367, 图 6147. 1975; Keraudren in Aubréville et Leroy, Fl. Cambodge