

有栽培。

本种种子富含油脂,可榨油食用。

1b. 腺点油瓜(变种) 无棱油瓜

var. **capniocarpa** (Ridl.) Tsai, comb. nov. — *Hodgsonia capniocarpa* Ridl. in Journ. Fed. Mal. States Mus. **10**: 135. 1920. — *H. macrocarpa* (Bl.) Cogn. var. *capniocarpa* (Ridl.) Tsai, 中国植物学会三十周年年会论文摘要汇编 156. 1963, nom. invalidum.

本变种与油渣果(原变种)的主要区别在于: 叶片大多数掌状5深裂, 果实扁圆, 无棱, 腺点十分明显而多。

产云南南部。马来西亚也有。

3. 南瓜亚族——Subtrib. CUCURBITINAE Pax

Pax in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenf. IV, **5**: 32. 1889; C. Jeffrey in Kew Bull. **15**(3): 340. 1962, p. p. max.; Hutch., Gen. Fl. Pl. **2**: 407. 1967.

花冠钟状, 5裂至中部或中部之上, 裂片全缘; 胚珠多数, 水平生。

9属, 我国产1属。

28. 南瓜属——*Cucurbita* Linn.

Linn., Sp. Pl. ed. 1. 1010. 1753, et Gen. Pl. ed. 5. 441. 1754; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. **1**: 828. 1867; Cogn. in DC., Mon. Phan. **3**: 542. 1881; Hutch., Gen. Fl. Pl. **2**: 401. 1967.

一年生蔓生草本; 茎、枝稍粗壮。叶具浅裂, 基部心形。卷须2—多歧。雌雄同株。花单生, 黄色。雄花: 花萼筒钟状, 稀伸长, 裂片5, 披针形或顶端扩大成叶状; 花冠合瓣, 钟状, 5裂仅达中部; 雄蕊3枚, 花丝离生, 花药靠合成头状, 1枚1室, 其它2室, 药室线形, 曲折, 药隔不伸长; 无退化雌蕊。雌花: 花梗短; 花萼和花冠同雄花, 退化雄蕊3, 短三角形; 子房长圆状或球状, 具3胎座; 花柱短, 柱头3, 具2浅裂或2分歧, 胚珠多数, 水平着生。果实通常大型, 肉质, 不开裂。种子多数, 扁平, 光滑。

约30种, 分布于热带及亚热带地区, 在温带地区栽培。我国栽培3种。

属模式种: 西葫芦 *C. pepo* Linn.

分种检索表

1. 花萼裂片不扩大成叶状; 瓜蒂不扩大成喇叭状。

2. 叶片三角形或卵状三角形, 不规则5—7浅裂; 花萼裂片条状披针形; 果柄有强烈的棱沟, 瓜蒂变粗或稍扩大, 但不成喇叭状; 种子边缘拱起而钝…………… 1. 西葫芦 *C. pepo* Linn.