

M. Keraudren-Aymonin (1975) 在《Flore Du Cambodge Du Laos et Du Viêt-Nam》15 卷 26 页中所描写的本种,叶两面均被毛或极稀变无毛;花萼裂片三角形,长 3 毫米,被短柔毛,花冠裂片三角形,被短柔毛等特征似为绞股蓝的 3 小叶类型,不为本种。而在评注中提及的三位山 (Bavi) Petelot 5682 号标本应为本种。

3. 缅甸绞股蓝 毛绞股蓝(中国高等植物图鉴)

Gynostemma burmanicum King ex Chakr. in Ind. Journ. Agric. Sc. **16**(1): 85. 1946, et in Rec. Bot. Surv. Ind. **17**(1): 190. 1959; 中国高等植物图鉴 **4**:349,图 6111. 1980; 吴征镒、陈书坤,植物分类学报 **21**(4): 360. 1983.

3a. 缅甸绞股蓝(原变种) 图版 66: 7—9

var. **burmanicum**

攀援藤本;茎较粗壮,具纵棱及槽,节上密被短柔毛,节间无毛,有时具皮孔。叶纸质,具 3 小叶,两面均被坚挺短梗毛,叶柄长 3—6.5 厘米,具纵棱及槽,密被皱波状短柔毛;中间小叶片近菱形,长 (6—)8—12 厘米,宽 3—5.5 厘米,先端短渐尖,基部阔楔形,边缘具疏粗齿,齿具短尖头,侧生小叶长 4—9 厘米,宽 4 厘米,极不等边,外侧为半卵形,基部圆形,内侧为半披针形或倒披针形,基部变狭,侧脉 8—9 条,两面凸起,细脉不明显,中间小叶柄长 5—6 毫米,两侧小叶近无柄。卷须 2 歧,具条纹。花雌雄异株。雄花排成圆锥花序,与叶等长或稍长,被短柔毛。花萼裂片长圆形,长 0.75 毫米,宽 0.3 毫米,先端钝;花冠绿色,5 深裂,裂片多少椭圆形,先端急尖或短渐尖;雄蕊群高约 1 毫米,无毛。雌花未见。浆果球形,径 5—6 毫米,绿色,无毛,内有种子 3 粒;种子阔卵形,长 3(—3.5) 毫米,宽 3 毫米,厚 2 毫米,淡褐色,压扁,基部近圆形,侧边具沟,两面具乳突状凸起。

产云南南部。生于海拔 800—1200 米的疏林或灌丛中。分布于泰国、缅甸。

3b. 大果绞股蓝(变种)

var. **molle** C. Y. Wu ex C. Y. Wu et S. K. Chen, 植物分类学报 **21**(4): 360. 1983.

本变种与缅甸绞股蓝(原变种)的主要区别是植物体各部均密被坚挺的短毛,果实较大,径 8—10 毫米,种子长 5 毫米。

产云南南部和东南部。生于海拔 630—1300 米的山谷丛林中或湿润的疏林中。模式标本采自云南普洱。

4. 绞股蓝

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino in Bot. Mag. Tokyo **16**: 179. 1902; Hand.-Mazz., Symb. Sin. **7**(4—6): 1066. 1936. Back. et Bakh. f., Fl. Java **1**: 306. 1963; 陈焕镛等,海南植物志 **1**: 183, 图 266 1964; Hara, Fl. E. Himal. 323. 1966; 中国高等植物图鉴 **4**: 349, 图 6112. 1975; Keraudren in Auréville et Leroy, Fl. Cambodge Laos Viêt-Nam **15**: 25, fig. 5. 1975; 吴征镒, 陈书坤, 植物分类学报 **21**(4):