

分 种 检 索 表

1. 平卧草本, 节上生根, 通常肉质; 叶片卵形或阔卵形; 花单生叶腋 (组 1. 铜锤玉带组 Sect. *Pratia*).
 2. 叶大, 长 0.8—1.6 厘米, 宽 0.6—1.8 厘米, 有柄; 花萼裂片长 3—4 毫米 1. 铜锤玉带草 *P. nummularia* (Lam.) A. Br. et Aschers.
 2. 叶小, 长约 5.5 毫米, 宽 4.5 毫米, 近无柄; 花萼裂片长 1.2—2.5 毫米 2. 广西铜锤草 *P. wollastonii* S. Moore
1. 直立草本, 茎粗壮; 叶片椭圆形至披针形; 花生于上部叶腋或形成总状花序 [组 2. 紫锤草组 Sect. *Coleosia* (Hook. f.) Hemsl.]
 3. 花单生上部叶腋; 花萼裂片条形, 全缘, 弓曲或反折。
 4. 花萼裂片长 2—6 毫米; 叶缘具圆齿。
 5. 花萼裂片长 2—3 毫米, 果期反曲 3. 短萼紫锤草 *P. brevisepala* Lian
 5. 花萼裂片长 4—6 毫米, 花期即强烈反折 4. 西藏紫锤草 *P. reflexa* Lian
 4. 花萼裂片长 7 毫米, 果期伸长可达 1 厘米; 叶缘微波状并具长腺齿 5. 山紫锤草 *P. montana* (Reinw.) Hassk.
 3. 花集成总状花序; 花萼裂片狭三角形, 每边具腺齿 2(3) 枚, 伸直 6. 峨眉锤草 *P. fangiana* E. Wimm.

组 1. 铜锤玉带组——Sect. *Pratia* ——Sect. *Eupratia* Endl., Gen. 1: 512. 1838; Hemsl. in Hook. Icon. Pl. 4. t. 1532. 1886; Baill, Hist. Pl. 8: 366. 1886; Schonland, in Engler-Prantl, Pflanzenfam. 4(5): 69. 1894; E. Wimm., Pfl. R. Heft 106: 107. 1943. ——Sect. *Bernonia* Endl., l. c., 512. 1838.

草本, 茎平卧, 节上生根, 花单生叶腋。约 20 余种, 我国有 2 种。

1. 铜锤玉带草

Pratia nummularia (Lam.) A. Br. et Aschers., Index Sem. Hort. Berol. 1861, Append. 6; E. Wimm., Pfl. R. Heft 106: 112. 1943. ——*Lobelia nummularia* Lam., Dict. 3: 589. 1789. ——*Rapuntium nummularium* Presl, Prodr. Monogr. Lobeliac. 30. 1836. ——*Piddingtonia nummularia* A. DC. in DC., Prodr. 7: 341. 1839; Hook. f. et Thoms., Journ. Linn. Soc. Bot. 2: 26. 1858. ——*Lobelia begoniifolia* Wall., Asiat. Res. 13: 377. 1820. ——*Pratia begonifolia* Lindl., Bot. Reg. t. 1373. 1830. ——*Lobelia javanica* Thunb., Fl. Jav. 9, 1825. ——*Pratia zeylanica* Hassk., Flora 25: 2, 1842, Beibl. 1, p. 23; Cat. Hort. Bogor. 106. 1844. ——*Lobelia obliqua* Hamilt. ex D. Don, Prodr. Nepal. 158. 1825. ——*Lobelia horsfieldiana* Miq., Fl. Ind.-Bat. 2: 577. 1857.

多年生草本, 有白色乳汁。茎平卧, 长 12—55 厘米, 被开展的柔毛, 不分枝或在基部有长或短的分枝, 节上生根。叶互生, 叶片圆卵形、心形或卵形, 长 0.8—1.6 厘米, 宽

0.6—1.8 厘米，先端钝圆或急尖，基部斜心形，边缘有牙齿，两面疏生短柔毛，叶脉掌状至掌状羽脉；叶柄长 2—7 毫米，生开展短柔毛。花单生叶腋；花梗长 0.7—3.5 厘米，无毛；花萼筒坛状，长 3—4 毫米，宽 2—3 毫米，无毛，裂片条状披针形，伸直，长 3—4 毫米，每边生 2 或 3 枚小齿；花冠紫红色、淡紫色、绿色或黄白色，长 6—7(10) 毫米，花冠筒外面无毛，内面生柔毛，檐部二唇形，裂片 5，上唇 2 裂片条状披针形，下唇裂片披针形；雄蕊在花丝中部以上连合，花丝筒无毛，花药管长 1 毫米余，背部生柔毛，下方 2 枚花药顶端生髯毛。果为浆果，紫红色，椭圆状球形，长 1—1.3 厘米。种子多数，近圆球状，稍压扁，表面有小疣突。在热带地区整年可开花结果。

产西南、华南、华东及湖南、湖北、台湾和西藏。印度、尼泊尔、锡金、缅甸至巴布亚新几内亚也有。生于田边、路旁以及丘陵、低山草坡或疏林中的潮湿地。

全草供药用，治风湿、跌打损伤等。

2. 广西铜锤草

Pratia wollastonii S. Moore, Trans. Linn. Soc. Bot. 9: 89. 1916; Tsoong, Contr. Bot. Nat. Acad. Peiping 3(3): 118. f. 17c, 1935; E. Wimm., Pfl. R. Heft 106: 111. 1943.

草本。茎平卧，无毛，节上生根。叶互生，叶片卵形或宽卵形，长约 5.5 毫米，宽约 4.5 毫米，膜质，两端钝，边缘有细圆齿和散生的缘毛，近无柄。花单生叶腋，花梗远长于叶片，长 12—25 毫米；花萼筒窄陀螺状，近无毛，裂片条状披针形，长 1.2—2.5 毫米，先端钝，边缘生睫毛；花冠长 7.5 毫米，上唇裂片匙状长矩圆形，先端钝，下唇 3 裂，裂片长矩圆形，长约 4.5 毫米，先端稍钝；花药管长 1.8 毫米，前端具短的刚毛。花期 7 月。

产广西（北部）。巴布亚新几内亚也有。生于海拔 1300 米以下的潮湿稻田边。模式标本采自巴布亚新几内亚。

这个种极易同其它种相区分，但标本极少，作者仅看到秦仁昌 1928 年采于广西北部近贵州边界的唯一一张标本（R. C. Ching, n. 6006）。

组 2. 紫锤草组——*Sect. Colensoa* (Hook. f.) Hemsl., Hook. Icon. Pl. 16, 1886; E. Wimm., Pfl. R. Heft 106: 116. 1943.—*Sect. Speirema* (Hook. f. et Thoms.) Hemsl., l. c., 16. 1886.—*Colensoa* (genus) Hook. f., Fl. N. Zeal. 1: 157. 1853.—*Speirema* (genus) Hook. f. et Thoms., Journ. Linn. Soc. Bot. 2: 27. 1858.

直立草本，茎粗壮，高 0.5—1.5 米。叶大，长 6—18 厘米，宽 1.5—4.5 厘米。花大，长 1.5—2 厘米，单生叶腋或形成总状花序。共有 15 种左右，我国有 4 种。

3. 短萼紫锤草（新种） 图版 26: 1—4

Pratia brevisepala Lian, sp. nov., in Addenda