

0.6—1.8 厘米,先端钝圆或急尖,基部斜心形,边缘有牙齿,两面疏生短柔毛,叶脉掌状至掌状羽脉;叶柄长2—7毫米,生开展短柔毛。花单生叶腋;花梗长0.7—3.5厘米,无毛;花萼筒坛状,长3—4毫米,宽2—3毫米,无毛,裂片条状披针形,伸直,长3—4毫米,每边生2或3枚小齿;花冠紫红色、淡紫色、绿色或黄白色,长6—7(10)毫米,花冠筒外面无毛,内面生柔毛,檐部二唇形,裂片5,上唇2裂片条状披针形,下唇裂片披针形;雄蕊在花丝中部以上连合,花丝筒无毛,花药管长1毫米余,背部生柔毛,下方2枚花药顶端生髯毛。果为浆果,紫红色,椭圆状球形,长1—1.3厘米。种子多数,近圆球状,稍压扁,表面有小疣突。在热带地区整年可开花结果。

产西南、华南、华东及湖南、湖北、台湾和西藏。印度、尼泊尔、锡金、缅甸至巴布亚新几内亚也有。生于田边、路旁以及丘陵、低山草坡或疏林中的潮湿地。

全草供药用,治风湿、跌打损伤等。

2. 广西铜锤草

Pratia wollastonii S. Moore, Trans. Linn. Soc. Bot. 9: 89. 1916; Tsoong, Contr. Bot. Nat. Acad. Peiping 3(3): 118. f. 17c, 1935; E. Wimm., Pfl. R. Heft 106: 111. 1943.

草本。茎平卧,无毛,节上生根。叶互生,叶片卵形或宽卵形,长约5.5毫米,宽约4.5毫米,膜质,两端钝,边缘有细圆齿和散生的缘毛,近无柄。花单生叶腋,花梗远长于叶片,长12—25毫米;花萼筒窄陀螺状,近无毛,裂片条状披针形,长1.2—2.5毫米,先端钝,边缘生睫毛;花冠长7.5毫米,上唇裂片匙状长矩圆形,先端钝,下唇3裂,裂片长矩圆形,长约4.5毫米,先端稍钝;花药管长1.8毫米,前端具短的刚毛。花期7月。

产广西(北部)。巴布亚新几内亚也有。生于海拔1300米以下的潮湿稻田边。模式标本采自巴布亚新几内亚。

这个种极易同其它种相区分,但标本极少,作者仅看到秦仁昌1928年采于广西北部近贵州边界的唯一一张标本(R. C. Ching, n. 6006)。

组2. 紫锤草组——Sect. *Colensoa* (Hook. f.) Hemsl., Hook. Icon. Pl. 16, 1886; E. Wimm., Pfl. R. Heft 106: 116. 1943.——Sect. *Speirema* (Hook. f. et Thoms.) Hemsl., l. c., 16. 1886.——*Colensoa* (genus) Hook. f., Fl. N. Zeal. 1: 157. 1853.——*Speirema* (genus) Hook. f. et Thoms., Journ. Linn. Soc. Bot. 2: 27. 1858.

直立草本,茎粗壮,高0.5—1.5米。叶大,长6—18厘米,宽1.5—4.5厘米。花大,长1.5—2厘米,单生叶腋或形成总状花序。共有15种左右,我国有4种。

3. 短萼紫锤草(新种) 图版26: 1—4

Pratia brevisepala Lian, sp. nov., in Addenda