

膜质的翅,翅常内叠,边缘疏生缘毛;花药在花蕾中围着花柱上部,和集粉杯下部粘成一管,花开放后分离,药隔超出药室,顶端成片状。核果卵球状,白色而无毛或有柔毛,直径7—10毫米,有两条径向沟槽,将果分为两片,每片有4条棱,2室,每室有一颗种子。花果期4—12月。

产台湾、福建、广东、广西。生于海边,通常在开旷的海边砂地上或海岸峭壁上。日本(琉球)、东南亚、马达加斯加、大洋洲热带、密克罗尼西亚,以及夏威夷也有。

2. 小草海桐(中国高等植物图鉴)

Scaevola hainanensis Hance, Journ. Bot. 7: 229. 1878; Oliv., Hook. Icon. Pl. 20: tab. 1979. 1891; 中国高等植物图鉴, 4: 400. 图 6213. 1975.

蔓性小灌木,老枝细长而秃净,小枝短而多,被糙伏毛,叶腋处有一簇长绒毛。叶螺旋状着生,在枝顶较密集,有时侧枝不发育而极端缩短,使叶簇生,叶无柄或具短柄,肉质,条状匙形,长1—2.5厘米,宽2—5毫米,全缘,只背面一条主脉可见,无毛。花单生叶腋;花梗长约1毫米;小苞片对生,位于花梗顶端,宽条形,长3—4毫米,腋内有一簇绒毛;花萼无毛,筒部倒卵状矩圆形,长约2毫米,顶端波状5浅裂,形成一个浅杯;花冠淡蓝色,长约8毫米,后方开裂至基部,其余裂至中部,外面无毛,筒内面密生长毛,裂片向一方展开,裂片狭长椭圆形,有宽的膜质翅,翅缘下部多少流苏状;药隔超出药室;子房2室,花柱下部有短毛。

产广东、福建和台湾。越南沿海地区也有。生于海边盐田或与红树同生。模式标本采自广东海南。

2. 离根香属——*Calogyne* R. Br.

R. Br., Prod. 579. 1810.——*Balingayum* Blanco, Fl. Filip. 187. 1837.

花单生叶腋,无苞片和小苞片。花萼筒部与子房贴生,檐部5裂。花冠后方开裂过半,裂片向前方伸展,每边具宽翅,后方2枚具不对称的翅。雄蕊5枚,离生。子房下位,不完全2室,有胚珠数颗。花柱从中部起有2—3个分枝。柱头基部的集粉杯浅2裂,口沿密生刷状毛,柱头片状而不裂。蒴果与隔膜平行地开裂。种子扁平,边缘稍稍加厚。一年生草本,直立或铺散。叶互生。

5—6种,5种产澳大利亚,其中一种也产东南亚,另一种产越南、柬埔寨、老挝。我国南方产1种。

1. 离根香 肉桂草

Calogyne pilosa R. Br., Prod. 579. 1810; A. DC. in DC., Prod. 7: 517. 1839; P. W. Leenh. in Fl. Males. ser. 1, 5(3): 337. 1957; 中国高等植物图鉴, 4: 400. 图 6214. 1975.

一年生草本,直立,仅具单支主茎,而主茎上有分枝,或茎多枝丛生,高5—15厘米,有