

此种名称较多,北方和江苏通称佩兰,江西、湖北、湖南、贵州通称兰草,北方亦称香草;江苏有时又称八月白,失力草,湖北有时称铁脚升麻或称杆升麻。

4. 林泽兰 (中国药用植物志) 尖佩兰

Eupatorium lindleyanum DC., Pradr. 5: 180, 1836; Benth., Fl. Hongk. 172, 1861; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 23: 404, 1888; Hayata, Comp. Formos. 9, 1904. et Ic. Pl. Formos. 8: 45, 1919; Nakai, Fl. Koreana 2: 5, 1911 et Fl. Sylv. Koreana 14: 112, 1923; Merr. in Sunyats. 14 (1): 42, 1930; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1087, 1936; Chang in Sunyats. 3: 278, 1937; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. Ser. B. 13: 277, 1937 et in Journ. Jap. Bot. 24: 78, 1949; 裴鉴、周太炎, 中国药用植物志 6: t.298, 1958; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册, 745, 1959; 刘慎谔, 东北植物检索表, 370, 1959; S. Y. Hu in Journ. Quart. Taiwan Mus. 19: 259, 1966. — *Eupatorium kirilowi* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 10 (7): 153, 1873; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 2: 455, 1934; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 12: 203, 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 19: 258, 1966. — *Eupatorium subtetragonum* Miq. in Journ. Bot. Neerl. 1: 99, 1861. — *Eupatorium lindleyanum* DC. var. *trifoliolatum* Makino in Bot. Mag. Tokyo 27: 80, 1913; Kitag., Lineam. Fl. Manch. 450, 1939. — *Eupatorium lindleyanum* DC. f. *aureo-reticulatum* Makino in Journ. Jap. Bot. 2: 5, 1918. — *Eupatorium cannabinum* auct., non DC.; Ling in Contr. Inst. Bot. Acad. Peip. 2: 457, 1934.

林泽兰(原变种)

DC. var. *lindleyanum*

多年生草本,高30—150厘米。根茎短,有多数细根。茎直立,下部及中部红色或淡紫红色,基部径达2厘米,常自基部分枝或不分枝而上部仅有伞房状花序分枝;全部茎枝被稠密的白色长或短柔毛。下部茎叶花期脱落;中部茎叶长椭圆状披针形或线状披针形,长3—12厘米,宽0.5—3厘米,不分裂或三全裂,质厚,基部楔形,顶端急尖,三出基脉,两面粗糙,被白色长或短粗毛及黄色腺点,上面及沿脉的毛密;自中部向上与向下的叶渐小,与中部茎叶同形同质;全部茎叶基出三脉,边缘有深或浅犬齿,无柄或几乎无柄。头状花序多数在茎顶或枝端排成紧密的伞房花序,花序径2.5—6厘米,或排成大型的复伞房花序,花序径达20厘米;花序枝及花梗紫红色或绿色,被白色密集的短柔毛。总苞钟状,含5个小花;总苞片覆瓦状排列,约3层;外层苞片短,长1—2毫米,披针形或宽披针形,中层及内层苞片渐长,长5—6毫米,长椭圆形或长椭圆状披针形;全部苞片绿色或紫红色,顶端急尖。花白色、粉红色或淡紫红色,花冠长4.5毫米,外面散生黄色腺点。瘦果黑褐色,长3毫米,椭圆状,5棱,散生黄色腺点;冠毛白色,与花冠等长或稍长。花果期5—12