

匙形或长圆形。中部茎叶长3—6厘米，宽1.5—3厘米，羽裂或大头羽裂，侧裂片1—3对，向下渐收窄，基部扩大，耳状抱茎。自中部向上或向下的叶渐小，匙形或宽匙形，边缘深圆锯齿。有时植株全部叶较小，匙形，长2—2.5厘米，宽约1厘米。全部叶两面被白色疏或密短毛，有时脱毛或几无毛。头状花序小，扁球形，径约5毫米，生枝端，少数或多数头状花序在茎顶和枝端排成疏松或紧密的伞房花序或圆锥状伞房花序，花序梗稍粗，被尘状微柔毛或几无毛。总苞片1—2层，长圆形，稍不等长，长约1毫米，边缘锯齿状微裂。花托半球形突起，顶端平。外围雌花多层，白色，花冠卵形或坛形，基部膨大，上端收窄，长0.6—0.7毫米，顶端2—3个微齿。中央两性花少数，黄绿色，花冠管状，长0.8—0.9毫米，管部短，狭细，檐部长钟状，有4—5裂齿。瘦果压扁，光滑倒披针形，边缘脉状加厚。无冠毛，或两性花瘦果的顶端有1—2个细毛状冠毛。花果期全年。

产于云南、四川、贵州、广西、湖北西部。生于山坡与山谷草地、河岸、溪旁、路旁或田边荒地。海拔1350—3200米。印度也有分布。

云南又叫小馒头草、蛆头草、地胡椒；贵州又名鬍子草、地细辛。药用同鱼眼草。

12. 杯菊属——*Cyathocline* Cass.

Cass. in Ann. Sci. Nat. I. 17: 419, 1829; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 261, 1873; O. Hoffm. in Engler et Prantl., Pflanzenf. IV. 5: 153, 1890.

一年生草本，叶互生，羽状分裂。头状花序小，异型，盘状，在茎枝顶端排成圆锥伞房花序或近总状花序。花托杯状或漏斗状，边缘突起，中部凹陷，无托片。总苞半球形；总苞片近2层，稍不等大，披针形，边缘膜质。边花多层，雌性，结实，花冠线形，白色，顶端通常2齿裂，花柱分枝短。中央两性花不育，管状，檐部狭钟状，顶端5齿裂。花药基部截形。两性花花柱不分枝或微弱的二叉状分枝。瘦果小，长圆形，扁平，无加厚边缘。无冠毛。

全属约2种，产于印度及我国西南部的亚热带地区。我国有1种。

1. 杯菊 图版 26: 4—6

Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex De Don) O. Kuntze., Rev. Gen. 333, 1891.——*Tanacetum purpureum* Buch.-Ham. ex De Don, Prodr. Fl. Nep. 181, 1825.——*Cyathocline lyrata* Cass. in Ann. Sci. Nat. I. 17: 34, 1829; Forbes et Hemsl. in Journ. Soc. Bot. 23: 407, 1829; DC., Prodr. 5: 373, 1836; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 246, 1881; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1088, 1936; S. Y. Hu in Journ. Quart. Taiwan Mus. 19: 231, 1966.——*Dichrocephala minutiflora* Vaniot. in Bull. Acad. Internat. Geogr. Bot. 12: 242, 1903

一年生草本，高10—15厘米。或无明显主根而侧根多数，或主根明显而直伸。茎直立，粗壮而坚细，基部径有时可达6毫米，通常自基部分枝，分枝斜升。全部茎枝红紫色或