

植株极矮小,茎不超过2厘米,单生,叶全部密集于基部,密被短硬毛和腺毛与原变种不同。

产于我国西藏南部(曲水),海拔3600米。

白舌变种

var. *alboradiatus* Ling et Y. L. Chen in Act. Phytotax. Sin. 11: 409. 1973.

此变种的舌片白色;总苞片顶端紫色与前面两个变种都不同。

产于云南东部(嵩明)。

3. 多舌系——Ser. *Multiradiati* Ling et Y. L. Chen in Act. Phytotax. Sin. 11: 410. 1973.

总苞片显明超出花盘;茎叶多数;两性花花冠黄色,裂片常紫色;多年生草本。

11. 多舌飞蓬 图版 77: 1—4

Erigeron multiradiatus (Lindl.) Benth., Gen. Pl. 2: 281. 1873; C. B. Clarke, Comp. Ind. 56. 1876; Benth. in Curtis's Bot. Mag. 106: Pl. 6530. 1880; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 256. 1881; Diels in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 504. 1922; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1094. 1936, et in Act. Hort. Goth. 12: 227. 1938; Kitam., Fl. Afgh. 2: 422. 1960. Ling in Act. Phytotax. Sin. 11: 410. 1973.;——*Aster multiradiatus* Wall., Cat. 2969. 1831, nom. nud.——*Stenactis multiradiatus* Lindl. ex DC., Prodr. 5: 229. 1836.——*Aster inuloides* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 178. 1825. non *Erigeron inuloides* Poir.——*Erigeron multiradiatus* var. *platyphyllus* Franch. ex Lévl., Cat. Pl. Yun-Nan 44. 1915, nom. nud.——*Aster roylei* Onno in Bibl. Bot. 106: 67. 1932.

多年生草本,根状茎木质,较粗壮,径3—6毫米,斜升或横卧,有或无分枝,具纤维状根,颈部被纤维状残叶的基部。茎数个或单生,高20—60厘米,基部径2—4毫米,直立,有分枝,或有时不分枝,绿色,基部或全部紫色,具条纹,被较疏的,上部被较密的短硬毛,杂有贴生短毛和头状具柄腺毛,节间长2—4厘米。基部叶密集,莲座状,在花期常枯萎,长圆状倒披针形或倒披针形,长5—15厘米,宽0.7—1.5毫米,全缘或具数个齿,顶端尖或稍钝,基部渐狭基部常紫色的长柄,具3—5脉,两面被疏短硬毛和头状具柄腺毛,下部叶与基部叶同形,具短柄,中部和上部叶无柄,卵状披针形或长圆状披针形,或少有狭披针形,长4—6厘米,宽0.6—2厘米,全缘或少有疏齿,顶端尖或渐尖,基部扩大,半抱茎,最上部叶极小,线形或线状披针形,长1—2厘米,宽0.1—0.2厘米,顶端渐尖。头状花序径3—4厘米,或更大,通常2至数个伞房状排列,或单生于茎枝的顶端;总苞半球形,长8—10毫米,宽15—20厘米,总苞片3层,显明超出花盘,线状披针形,宽约1毫米,顶端渐