

管部 0.5—1.2 毫米；两性花管状，黄色，长 3.5—5 毫米，檐部窄圆锥形，管部上部被微毛，裂片玫瑰色；瘦果窄长圆形，长 2.2—2.5 毫米，宽 0.6 毫米，扁压，密被贴短毛；冠毛白色，2 层，刚毛状，外层极短，内层 4.3—5 毫米。花期 7—9 月。

产于新疆北部(托里、昭苏、奇台、阿拉套山、阿尔泰)。亦分布于苏联中亚至西伯利亚地区。生长于开旷山坡草地，海拔 1700—2800 米。

32. 假泽山飞蓬 图版 82: 1—4

Erigeron pseudoseravschanicus Botsch., Fl. URSS 25: 585. 1959; Ling et Y. L. Chen in Act. Phytotax. Sin. 11: 426. 1973. — *E. alpinus* auct., non L.: M. Pop. in Act. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS 1, 7: 11. 1948.

多年生草本，根状茎木质，垂直或斜上，有分枝，具纤维状根，颈部被残存叶的基部。茎少数，高 5—60 厘米，基部径 1—3 毫米，直立上部有分枝，被较密而开展的长节毛和疏具柄腺毛，或有时杂有贴短毛，下部常被密长节毛而无腺毛，极少近无毛；叶缘色，全缘，两面被开展的疏长节毛和具柄腺毛，有时仅边缘有睫毛状长节毛，基部叶密集，莲座状，花期常枯萎，倒披针形，长 2—15 厘米，宽 0.3—1.6 毫米，顶端尖或稍钝，基部渐狭成长柄，下部叶与基部叶相同，中部和上部叶无柄，披针形，长 0.3—1.3 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，顶端急尖；头状花序多数，排列成伞房状总状花序，长 7—14 毫米，宽 13—30 毫米，具长花序梗，总苞半球形，总苞片 3 层，常稍短于花盘，绿色或有时变紫色，线状披针形，顶端急尖，背面被密具柄腺毛和开展的疏长节毛，稀仅有腺毛，内层总苞片长 5—7 毫米，宽约 0.8 毫米，外层短于内层的二分之一；雌花二型，外层舌状，长 5.8—8.5 毫米，管部长 2.2—3.5 毫米，上部被疏微毛，舌片淡红色或淡紫色，宽 0.3 毫米，顶端全缘；较内层细管状，无色，长 2.2—3 毫米，上部被贴微毛，花柱伸出管部 0.5—1.5 毫米；两性花管状，黄色，长 4—4.7 毫米，管部长 1.5—2 毫米，檐部狭锥形，被贴微毛，裂片淡红色或淡紫色；瘦果长圆状披针形，长 2—2.2 毫米，宽约 0.6 毫米，扁压，密被贴短毛；冠毛白色，2 层，刚毛状，外层极短，内层 4—5.3 毫米。花期 7—9 月。

产于我国新疆北部(清河、托里、和靖、乌鲁木齐、木垒、巩留等)。也分布于苏联中亚、西伯利亚。常生于亚高山或高山草地或林缘，海拔 1700—2800 米。

本种主要以茎常被较密的疏长毛和具柄腺毛，茎下部仅有开展的密长毛而无腺毛；舌片淡紫色与上面一种相区别。

假泽山飞蓬(原变型)


f. *pseudoseravschanicus*

无毛变型

f. *glabrescens* Ling et Y. L. Chen in Act. Phytotax. Sin. 11: 426. 1973.

茎和叶无毛或近无毛，上部及总苞片仅有具柄腺毛。

产于新疆(清河)。



1—4. 假泽山飞蓬 *Erigeron pseudoseravschanicus* Botsch.: 1. 植株; 2. 舌状雄花; 3. 丝状雌花; 4. 两性花。5—8. 天山飞蓬 *Erigeron tianschanicus* Botsch.: 5. 植株; 6. 舌状雌花; 7. 丝状雌花; 8. 两性花。(冯晋庸绘)