

苞片与花盘近等长或稍长于花盘,极为特别。

36. 小舌菊属——*Microglossa* DC.

DC., Prodr. 5: 320. 1836; Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 282.

1873; O. Hoffm. in Engl. et Prantl., Pflanzenf. IV. 5: 168.

1890.

半灌木,直立或攀援,叶互生,具柄,卵状长圆形,全缘或具不明显的锯齿。头状花序较小,多数密集成复伞房状花序,辐射状,具异形花;总苞钟状,总苞片多层,覆瓦状,干膜质,长圆状披针形或线形,顶端稍钝,外层较短;花托平或稍凸,无托毛,花全部结实,外围的雌花多数,舌状,舌片白色,丝状,短于花柱;中央的两性花少数,花冠管状,黄色檐部膨大,具3—5齿裂;花药顶端尖,基部钝,全缘;花柱分枝扁,顶端尖,长披针形;瘦果圆柱状,长圆形,边缘具棱,两面具1肋,被短柔毛;冠毛略红色,1—2层,多数,糙毛状,多少等长。

约10种,主要分布于亚洲和非洲。我国有1种,产华南、西南及台湾。

1. 小舌菊 九里明 过山龙(海南) 梨叶小舌菊(广西) 图版84: 1—3

Microglossa pyrifolia (Lam.) O. Kuntze, Rev. Gen. 1: 353. 1891; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1094. 1936; Chang in Sunyts. 3: 284. 1937; Kitam. in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. Ser. B. 13: 381. 1937; 中国高等植物图鉴 4: 447, 图6308. 1975.——*Conyza pyrifolia* Lam., Encycl. 2: 89. 1786; Blume, Fl. Netherl. Ind. 896. 1825.——*Microglossa volubilis* DC., Prodr. 5: 320. 1836; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 419. 1888; Hayata, Comp. Formos. 8. 1904, et Ic. Formos. 8: 51. 1919. Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 2: 474. 1934.——*Conyza syringaeifolia* Meyen et Walpers, in Nov. Act. Acad. Leop.-Carol. Nat. Cur. 19 (Suppl. 1): 263. 1843; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 420. 1888.——*Erigeron pyrifolius* (Lam.) Benth., Fl. Hongk., 176. 1861.——*Blumea conyzoides* Lévl. et Vaniot in Fedde Repert. Sp. Nov. 7: 22. 1909.

半灌木,高70—150厘米。茎伸长,攀援状,叉状分枝,具明显条棱,被腺状短柔毛,后多少变无毛。叶互生,纸质,卵形或卵状长圆形,长5—10厘米,宽2.5—4厘米,顶端渐尖,基部楔形或楔状圆形,边缘具多少明显的疏小齿,或近全缘,上面绿色,被疏短柔毛,后多少变无毛,下面淡绿色,被密锈色短柔毛和腺点,叶柄长7—13毫米,被短柔毛。头状花序多数,径5—6毫米,在茎或枝顶端排列成密复伞房状花序;花序梗细,长2—5毫米,被短柔毛,常有披针形小苞片;总苞钟状;总苞片约5层,干膜质,外层卵状披针形,长0.7毫米,顶端钝,背面被短柔毛,中层披针形,内层线形,顶端钝或稍尖,具透明的边缘,背面具褐色中肋;花托稍凸,具蜂窝状小孔;外围的雌花多数,丝状,长3—3.5毫米,具极小的