

层,绿色,线状披针形或披针形,顶端渐尖或稍钝而多少撕裂,中央草质,顶端及边缘具宽干膜质,背面被疏短毛,外层约短于内层之半;花托半球形,中央稍凸起,径约2毫米,具边缘多少齿状的窝孔;花全部结实,外围的雌花极多数,花冠丝状,长约2毫米,顶端被疏微毛,短于花柱的二分之一;中央的两性花少数(约13—23个),花冠管状,淡黄色,长3—3.5毫米,管部长约1.5毫米,檐部狭钟状,裂片卵形,顶端被疏微毛;瘦果长圆形,长1—1.2毫米,扁压,两端缩小,边缘脉状,被疏贴短毛和腺点;冠毛污白色,1层,糙毛状,长3—3.5毫米。花期6月。

产于四川西南部(木里、里塘河岸边)。海拔2200米。

本种外形极似白酒草 *C. japonica* (Thunb.) Less., 但植株矮小;具木质的根状茎;茎叶线状披针形或线形,基部狭不抱茎,上部边缘具疏细齿或全缘;总苞较小,长约4毫米;瘦果具腺,与后者不难区别;与多年生白酒草 *C. perennis* Hand.-Mazz. 则以具较大的头状花序(径6—7毫米);总苞片具宽膜质边缘;叶线形或线状披针形,为区别。

7. 劲直白酒草 劲直假蓬

Conyza stricta Willd., Sp. Pl. 3: 1922. 1803; DC., Prodr. 5: 389. 1836; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 258. 1881, p. p.; *Conyza stricta* auct., non Willd.; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1095. 1936, p. p.

劲直白酒草(原变种)

var. *stricta*

一年生草本,根木质纺锤状,常弯曲,有多数纤维状根。茎直立,高30—65厘米,基部径3—5毫米,有细条纹,多分枝,分枝伞房状,细直,全株被灰白色糙毛状短柔毛,叶密集,下部叶花期凋落或枯萎,下部或有时中部叶匙状倒卵形,稀倒披针形,长3—5.5厘米,宽0.5—1.3厘米,顶端钝,具小尖或短尖,基部楔状渐狭成细柄,边缘具粗齿或羽状浅裂,稀全缘,侧脉3—4对,在下面明显,两面被灰白色糙短毛,叶腋内常发出2—4个的小叶丛,上部及分枝上的叶线形或线状倒披针形,无柄,长1.2—2厘米,宽2—4毫米,顶端钝而具小尖或短尖,全缘,1脉,上部叶渐小。头状花序极小,径(2)3毫米,极多数,在茎、枝顶端排成紧密复伞房状;花序梗长2—4毫米,有1线形或钻形小苞片,密被糙短柔毛,总苞半球形,径约3毫米;总苞片3层,短于花盘,线状披针形,顶端渐尖,外层绿色,稍短,被短毛,内层干膜质,长1.5—1.8毫米,顶端稍反折;花黄色,全部结实,外围的雌花多数,花冠舌状,长1.5毫米,舌片白色,极短,有时有2—3撕裂,常短于花柱,管部被疏微毛;中央有4—5(7)个两性花,花冠管状,长2毫米,管部被微毛,檐部有5披针形裂片,裂片有腺点;花托半球形,稍凸起,有明显的窝孔;瘦果长圆形,长约0.6毫米,有密腺;冠毛淡红色,2层,外层极短,内层刚毛状,与花冠几等长。花期9—11月。

产于云南东南部至西部(砚山、滇西)和四川、广东(海南东方)。印度、尼泊尔、缅甸、泰国及非洲东部也有。生长于草坡荒地或田边。