

米,稀更高,中部以上常分枝,常有斜上不育的侧枝,密被贴短毛,杂有开展的疏长毛。叶密集,基部叶花期常枯萎,下部叶倒披针形或长圆状披针形,长3—5厘米,宽0.3—1厘米,顶端尖或稍钝,基部渐狭成长柄,通常具粗齿或羽状浅裂,中部和上部叶具短柄或无柄,狭披针形或线形,长3—7厘米,宽0.3—0.5厘米,中部叶具齿,上部叶全缘,两面均密被贴糙毛。头状花序多数,径约8—10毫米,在茎端排列成总状或总状圆锥花序,花序梗长10—15毫米;总苞椭圆状卵形,长约5毫米,宽约8毫米,总苞片2—3层,线形,顶端尖,背面密被灰白色短糙毛,外层稍短或短于内层之半,内层长约4毫米,宽0.7毫米,具干膜质边缘。花托稍平,有明显的蜂窝孔,径3—4毫米;雌花多层,白色,花冠细管状,长3—3.5毫米,无舌片或顶端仅有3—4个细齿;两性花淡黄色,花冠管状,长约3毫米,管部上部被疏微毛,上端具5齿裂;瘦果线状披针形,长1.5毫米,扁压,被疏短毛;冠毛1层,淡红褐色,长约4毫米。花期5—10月。

产于我国中部、东部、南部至西南部各省区;原产南美洲,现广泛分布于热带及亚热带地区。常生于荒地,田边、路旁,为一种常见的杂草。

全草入药,治感冒、疟疾、急性关节炎及外伤出血等症。

38. 歧伞菊属——*Thespis* DC.

DC. in Guill., Arch. Bot. 2: 517. 1833; Benth. et Hook. f.,
Gen. Pl. 2: 285. 1873.

一年生矮小草本,无毛。茎直立,多分枝。叶互生,具齿或全缘;头状花序小,球形,数个在二歧分枝上簇生排成伞房状,无或几无花序梗,盘状,具异形花;总苞半球形,总苞片近2层,草质,宽而钝,边缘于膜质,具3脉,通常稍短于花盘;花托平或凸,无托毛,具小突起;花黄色,外围的雌花多层常无花冠,结实;中央的两性花少数,不结实;花冠管状,管部极短,檐部狭钟状,具4—5齿裂;花药顶端渐尖,基部钝,无耳;花柱分枝短,扁而稍尖;瘦果小,无肋,扁压,具乳头状突起;冠毛短毛状,扩大,6—13个。

1种,分布于喜马拉雅地区。我国云南也有分布。


1. 歧伞菊 图版 87: 5—8

Thespis divaricata DC. in Guill., Arch. Bot. 2: 517. 1833; et Prodr. 5: 375. 1836; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 22: 13. 1969; 中国高等植物图鉴 4: 450. 图 6314, 1975.

一年生草本,根纺锤状,具纤维状根。茎直立,高4—23厘米,基部有分枝,具细条纹,无毛。叶倒卵状披针形,倒卵形或匙形,长1—2.5厘米,宽0.5—1.5厘米,顶端渐尖,基部渐狭成具翅的柄,边缘有粗锯齿,侧脉2—4对,两面沿脉被疏短硬毛或近无毛。头状花序极小,径2—3毫米,通常5—10个簇生于二歧伞分枝的顶端,无或有极短花序梗,盘状,具异形花;总苞半球形,总苞片1—2层,卵状长圆形,长1.5—2毫米,顶端钝或稍尖,边缘

干膜质，具 3 脉，无毛；花托稍平，具小突起；雌花多层，通常无花冠，结实，两性花少数，花冠管状，管部极短，檐部漏斗状，顶端具 5 齿裂，瘦果长圆状纺锤形，长 1 毫米，压扁，具细乳头状突起；冠毛短毛状，雌花约 13 个，两性花 6—8 个。

产于云南南部(西双版纳)。印度、尼泊尔、锡金、柬埔寨也有分布。生于田边或路旁，海拔 1000 米。



1—4. 劲直白酒草羽裂变种 *Conyza stricta* Willd. var. *pinnatifida* (D. Don) Kitam.: 1. 植株; 2. 头状花序; 3. 雌花; 4. 两性花。5—8. 歧伞菊 *Theopsis divaricata* DC.: 5. 植株; 6. 头状花序; 7. 雌花; 8. 两性花。(冯晋庸绘)