

管状,长约6毫米,檐部3齿裂,无毛;两性花较少数,花冠管状,长约7毫米,檐部5浅裂,裂片卵状三角形,有密腺点。瘦果圆柱形,有10条棱,长约1毫米,被白色腺状粗毛。冠毛污黄色或黄白色,糙毛状,长约6毫米。花期8—11月。

产江西、湖南、广东、广西、浙江、福建、台湾。生于低山山坡、草丛、溪边或疏林下。模式标本采自台湾台北。

11. 密花艾纳香(植物分类学报)

Blumea densiflora DC., Prodr. 5: 446. 1836; C. B. Clarke, Comp. Ind. 88. 1876; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 269. 1881; Randeria in *Blumea* 10: 234. 1960. — *Blumea excisa* DC., Prodr. 5: 446. 1836. — *Blumea densiflora* DC. var. *pinnatifida* Miq. fide Gagnep., in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 548. 1924. — *Blumea dasycoma* (Miq.) Boerl. var. *pinnatifida* (Miq.) Boerl. Handl. Fl. Ind. 2, 1: 239. 1891. — *Conyza dasycoma* Miq. var. *pinnatifida* Miq., Fl. Ind. Bat. 2: 56. 1856.

11a. 密花艾纳香(原变种)

var. *densiflora*

草本或亚灌木状。茎粗壮,直立,高1—3米,基部木质,径1—2厘米或更粗,有分枝,具条棱,被锈褐色腺状密绒毛,幼枝及花序轴上的毛更密,节间长4—6厘米。茎叶宽椭圆形、狭椭圆形或长圆状披针形,长22—42厘米,宽8—16厘米,基部渐狭成具狭翅的柄,两侧有时具齿状或三角形的附属物,顶端具小尖头,边缘羽状浅裂或深裂,裂片具向上的细齿,上面被腺状绒毛,下面被密绵毛,中脉在两面明显凸起,上面具1条宽沟,下面具3—4条棱,侧脉多数;上部叶较小,长椭圆形,长7—20厘米,宽3—8厘米,边缘羽状浅裂或仅有粗齿。头状花序极多数,径5—7毫米,具短柄,在茎和枝顶端排列成具叶的大圆锥花序;总苞钟形,长约7毫米;总苞片约5层,绿色,外层长圆形或长圆状披针形,长1—3毫米,顶端尖,背面被密毛,中层和内层线形,长5—8毫米,顶端长细尖,边缘干膜质,背面被疏毛;花托平,蜂窝状,径1.5—2毫米,无毛。花黄色;雌花多数,花冠细管状,长3.5—4.5毫米,檐部3—4齿裂,无毛;两性花较少数,花冠管状,约与雌花等长,檐部5浅裂,裂片三角形,被多细胞节毛。瘦果圆柱形,长约1毫米,具条棱,被白色柔毛。冠毛淡红褐色,糙毛状,长约5毫米。花期11月至翌年4月。

产云南东南部(泸西、西畴、屏边)经景东至西北部澜沧江一带。生于密林下或山谷林缘,海拔1500—2800米。也分布于印度、巴基斯坦、缅甸、泰国、马来西亚和中