

部分退化而药无尾或有短尾。瘦果圆柱形,无棱条,被柔毛,长0.6毫米,中央的多半不育。冠毛白色,糙毛状,长3—4毫米,易脱落。花期4—5月。

产云南西部和西南部(双江、芒市、漾濞)。生于湿润山坡、草地或空旷的溪流边,海拔1200—1480米。此外,也分布于印度、巴基斯坦、缅甸、中南半岛、马来西亚和菲律宾。

组6. 疏花组——Sect. *Dissitiflorae* DC., Prodr. 5: 433. 1836.

叶基部圆或尖,边缘有疏生的细齿或密锯齿,但无刺状齿。头状花序单生、腋生或顶生,排列成疏散的圆锥花序或总状花序;外层总苞片线形;雌花花冠2—4等裂,裂片被毛或无毛;两性花花冠裂片有腺点或被毛,花药全部发育。瘦果有或无条棱;冠毛白色。

30. 狭叶艾纳香(新拟)

*Blumea tenuifolia* C. Y. Wu, nom. nov.—*Blumea gracilis* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 502. 1903, non DC.

草本。茎直立,高45—85厘米,基部径2—3毫米,不分枝,具条棱,下部脱毛,粗糙,上部被长柔毛和杂以腺体,节间长2—6厘米。下部叶无柄,线状披针形,长4—7.5厘米,宽4—8毫米,基部渐狭,顶端钝,有时具短尖头,边缘背卷,有疏生的细齿,上面被糙伏毛或脱毛仅存粗肿的基部,下面被密长柔毛,中脉在下面稍凸起,侧脉不明显;上部叶小,长1—3厘米,宽1—4毫米,两面被密毛。头状花序少数,径6—8毫米,排列成长而间断的总状花序;总苞钟形,长6—8毫米;总苞片4层,线形,外层叶质,长2—3毫米,顶端钝或短尖,背面被长柔毛和杂以腺体,内层边缘干膜质,基部略狭,顶端渐尖,背面顶部被毛,长6—8毫米;花托平,径约2毫米,无毛。花黄色,雌花多数,花冠细管状,长2—3毫米,檐部3齿裂,裂片浑圆,无毛;两性花少数,花冠管状,长3—3.5毫米,向上渐扩大,檐部5裂,裂片卵形,被密毛。瘦果圆柱形,被毛,长约1毫米。冠毛白色,糙毛状,长约4毫米。

产云南南部(思茅、西双版纳)及台湾。生于山谷空旷湿润地。模式标本采自云南。

据 Yamamoto (in Journ. Soc. Trop. Agric. 8: 274. 1936) 记载,本种在菲律宾也有分布。