

41. 拟艾纳香属——*Blumeopsis* Gagnep.

Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 26: 76. 1920.

直立草本，通常无毛或有时被疏柔毛。叶互生，有齿刻。头状花序少或较少，通常2—5个在枝顶排成伞房花序，多数伞房花序排列成圆锥花序，各有异型的小花，外围的雌花多层，黄色，中央的两性花少数，黄色或金黄色。总苞近钟形；总苞片数层，覆瓦状排列，外层较宽短，边缘干膜质，卵形，内层狭窄，干膜质，线形或倒披针形，顶端尾尖。花托扁平，无托毛。雌花花冠丝状，檐部扩大，具3—4齿；两性花花冠稍大，细管状，顶端4齿裂，或有时5裂。雄蕊1—3个，稀4个，或中央的小花有时雄蕊5个，花药分离，顶端浑圆或钝，基部无尾。花柱分枝线形，顶端无附器。瘦果稍扁，具2—3棱角，无毛。冠毛多数，白色，等长，易脱落。

1种，分布于中南半岛及印度。我国产云南、贵州、广西及广东沿海一带。

1. 拟艾纳香(海南植物志) 图版7: 4—7

Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 26: 76. 1920 et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 567. t. 61. fig. 1—6. 1924 (excl. syn. *Erigeron falcatum* D. Don); 中国高等植物图鉴 4: 456. 图 6326. 1975.——*Blumea flava* DC., Prodr. 5: 439. 1836.——*Laggera flava* Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 2: 290. 1873; Chang in Sunyats. 3: 288. 1937.——*Blumeopsis falcata* (D. Don) Merr. et Chun in Sunyats. 5: 197. 1940, non *Erigeron falcatum* D. Don.

一年生草本。茎直立，细弱，高可达1米，基部径1—4毫米，上部分枝，有明显细沟纹，无毛，节间长4—14厘米。基生叶或下部叶有不明显的短柄或近无柄，叶片倒卵形，连叶柄长3—10厘米，宽2—5厘米，基部狭，顶端浑圆，边缘有不明显的锐细齿，无毛或上面被白色疏柔毛，有5—9对侧脉，叶脉在下面明显，侧脉弧形弯拱，通常离缘网结，网脉明显；中部和上部叶小，无柄，倒卵状长圆形或长圆形，长2.5—6厘米，宽7—30毫米，基部心形或浑圆，通常抱茎，顶端钝或短尖，边缘有不规则的粗或细齿或细尖齿。头状花序疏或较密，径约6毫米，通常2—5个在枝顶作伞房花序式排列，多数伞房花序沿茎枝排列成圆锥状花序，花序梗纤细，长2—3毫米，无毛；总苞钟形，径5—6毫米，长6—7毫米；总苞片4层，无毛，麦秆黄色，中肋显著，外层卵形，长2.2毫米，基部弯曲，顶端钝，全缘或有时具不明显的齿刻，中层披针形，长约