

产我国东部、东南部至西南部，北至安徽、湖北。生于旷野、路旁以及山坡阳处地。分布于非洲东部、亚洲的菲律宾、印度尼西亚、中南半岛、印度、斯里兰卡。

2. 假六棱菊(新拟)

Laggera intermedia C. B. Clarke, Comp. Ind. 91. 1867; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 3: 570. 1924.

多年生草本。茎粗壮，直立，高约1米，基部径5—8毫米，基部木质，多分枝或上部多分枝，具沟纹，被密淡黄色短腺毛，茎翅阔，连续，宽2—5毫米，具粗齿或细尖齿，节间长1—3厘米。中上部叶长圆形，无柄，长5.5—10厘米，宽1.5—2.5厘米，基部沿茎下延成茎翅，顶端钝，边缘有疏细齿，两面被密短腺毛，中脉粗壮，两面匀凸起，侧脉通常8—10对，离缘弯拱网结，网脉明显；上部或枝叶小，长圆形，长1.5—2.5厘米，宽4—6毫米，顶端短尖、钝或中脉延伸成突尖状，边缘有远离的细齿或无齿。头状花序多数，径约1厘米，在茎枝顶端排成大型圆柱状圆锥花序；花序梗长5—25毫米，被密腺状短柔毛；总苞近钟形，长约12毫米；总苞片约6层；外层叶质，绿色，长圆形，长5—6毫米，顶端短尖或渐尖，少有钝的，背面密被腺状短柔毛，内层干膜质，线形，长7—8毫米，顶端短尖或渐尖，带紫红色，背面仅沿中肋被疏短柔毛或无毛。雌花多数，花冠丝状，长约7毫米，檐部3—4齿裂，裂片极小，无毛；两性花较少，花冠管状，长约8毫米，檐部5裂，裂片三角形，顶端稍尖，被乳头状腺毛，全部花冠淡紫红色。瘦果圆柱形，有棱，长约1毫米，疏被白色柔毛。冠毛白色，易脱落，长约6毫米。花期10月。

产广西西南部(龙津、上金)。生路旁及山坡阳处。分布于印度及中南半岛。

3. 翼齿六棱菊(新拟) 臭灵丹(种子植物名称) 图版8: 6—10

Laggera pterodonta (DC.) Benth., Gen. Pl. 2: 290. 1873; C. B. Clarke, Comp. Ind. 92. 1876; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1097. 1936 et in Act. Hort. Goth. 12: 228. 1938. — *Blumea pterodonta* DC., Prodr. 5: 448. 1836. — *Laggera purpurascens* Sch.-Bip. ex Hochst. in Fl. 24 (Intell. 1): 26. 1841.

草本。茎直立，粗壮或细弱，上部分枝，高达1米，基部径约5毫米，具沟纹，疏被短柔毛或杂有腺体，或有时无毛，茎翅连续或有时间断，宽不超过2毫米，有不整齐的粗齿或细齿，节间长1—3厘米。中部叶倒卵形或倒卵状椭圆形，稀椭圆形，无柄，长7—10(15)厘米，宽2—3.5(7)厘米，基部长渐狭或渐狭，沿茎下延成茎翅，顶端短尖或钝，两面疏被柔毛和杂以腺体，中脉和7—10对侧脉在下面稍凸起，网脉略明显；