

-1. 光梗阔苞菊 *P. pteropoda* Hemsl.
 1. 枝、叶、花序梗和外层总苞片的背面及边缘被毛;头状花序较小,径3—5毫米。
 2. 叶阔倒卵形至倒卵形,稀椭圆形,边缘有较密的细齿或锯齿.....
2. 阔苞菊 *P. indica* (L.) Less.
 2. 叶阔线形至线形,边缘具远离的疏齿.....3. 长叶阔苞菊 *P. eupatorioides* Kurz

1. 光梗阔苞菊(新拟) 图版9: 6—8


Pluchea pteropoda Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 422. 1888; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 6: 289. 1928; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 2: 474. 1934; Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. 6: 79. 1937.

草本或矮小亚灌木。茎斜升或平卧,高10—35厘米,基部径约5毫米,多分枝,有明显条纹,无毛,节间长1—2厘米。下部叶无柄,倒卵状长圆形或倒卵状匙形,长2.5—5厘米,宽8—18毫米,基部长渐狭,顶端钝或浑圆,边缘有锯齿,两面无毛,中脉在上面明显,在下面稍凸起,侧脉6—7对,网脉通常不明显;中部和上部叶无柄,倒卵状长圆形或披针形,长1.5—4厘米,宽6—14毫米,基部长狭,顶端钝,边缘有疏锯齿或有时浅裂。头状花序多数,径8—10毫米,在茎枝顶端排列成伞房花序;花序梗较粗,长2—6毫米;总苞卵状球形或阔钟形;总苞片5—6层,外层卵形或阔卵形,长3—4毫米,顶端短尖或钝,背面无毛,内层及中层狭,线形,长4—6毫米,顶端尖,无毛。雌花多数,丝状,长约4毫米,檐部3—4齿裂。两性花少数,花冠管状,长5—6毫米,檐部扩大,顶端5浅裂,裂片背面具泡状或乳头状突起。瘦果圆柱形,具4棱,长1.2—1.8毫米,被疏毛。冠毛白色,宿存,约与花冠等长,两性花的冠毛下部多少联合。花期5—12月。

产我国台湾和南部各省及沿海一些岛屿。生于海滨沙地、石缝或潮水能到达之地。中南半岛有分布。模式标本采自广西北海。

2. 阔苞菊(植物学名词审查本) 格杂树(海口); 栲栳(岭南采药录) 图版1: 9—11

Pluchea indica (L.) Less. in Linnaea 6: 150. 1831; DC., Prodr. 5: 451. 1836; Benth., Fl. Hongk. 179. 1861; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 422. 1888; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 183. 1927; Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. 6: 79. 1937; Chang in Sunyats. 3: 288. 1937; 中国高等植物图鉴 4: 457. 图6328, 1975.——*Baccharis indica* L., Sp. Pl. 861.



1—5. 花花柴 *Karelينيا caspica* (Pall.) Less., 1. 花枝; 2. 雌花; 3. 两性花; 4. 瘦果; 5. 雄蕊。6—8.
光梗阔苞菊 *Pluchea pteropoda* Hemsl., 6. 花枝; 7. 雌花; 8. 两性花。(刘春荣、吴影桦)