

Anaphalis margaritacea Benth. var. *tsoongiana* Ling in Contr. Bot. Surv. N—W. China 1, 2: 12. 1939.

茎高30—60厘米;叶线形,长3—10厘米,宽0.3—0.6厘米,顶端渐尖,下部叶顶端钝或圆形,上面被蛛丝状毛或脱毛,下面被淡褐色或黄褐色密棉毛;总苞同上变种,有时较小,长仅5毫米;花冠长约3毫米。

产甘肃西部和南部、陕西南部、四川、湖北西部、贵州、云南、西藏(波密、察隅)。生长环境同上,极常见。朝鲜、日本也有分布。

此变种在叶的长、宽和节间的长短等方面有极大的变异。通常不分枝,但茎断折后多分枝,且密生较短而顶端圆形的叶,与寻常生于茎下部的叶相似(var. *tsoongiana* Ling)。此变种与下一变种间有中间类型(var. *inter angustifoliam et cinnamomeam* Hand.-Mazz.)存在。

珠光香青黄褐变种

var. *cinnamomea* (DC.) Herd. ex Maxim. in Bull. Ac. Sc. St. Pétersb. 27: 481. 1882; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1102. 1936.——*Antennaria cinnamomea* DC., Prodr. 6: 270. 1837.——*Anaphalis cinnamomea* (DC.) C. B. Clarke, Comp. Ind. 104. 1876; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 281. 1881; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 2: 478. 1934.——*Gnaphalium cinnamomeum* Wall., Cat. 2944. 1831, nom. nud.

茎高50—100厘米,叶长圆状或线状披针形,长4—9厘米,宽0.7—1.2厘米,有时达2.5厘米,基部抱茎,顶端渐尖,上面被灰白色蛛丝状棉毛,下面被黄褐色或红褐色厚棉毛,有在下面凸起的三出脉或五出脉。总苞同上变种。

产云南、四川、贵州、甘肃南部及东部(榆中、天水)、陕西南部、湖北西部(恩施)。生于低山或亚高山灌丛、草地、山坡和溪岸。海拔500—2800米。较常见。也分布于尼泊尔、锡金、不丹、印度及缅甸。

此变种多变异,叶有时较大而具强壮的五出脉。有一较稀见的矛叶变型 *f. lancea* Ling et Shih (an var. in sched.), 茎高约50厘米,叶卵圆状披针形,长7—9厘米,宽2—2.5厘米,基部急狭或近圆形,抱茎,有显明的五出脉,或在两条脉之间有较细的脉而成九出脉状,上部叶较小,长5厘米。雄株的头状花序极少(有时仅20个),总苞长约4毫米,径5—7毫米,总苞片约5层。雌株未见到。产云南西北部(贡山、独江)。生于山谷坡地。海拔2800—2900米。可能是不正常发育的类型。

此变种曾被合并于原变种 var. *margaritacea* 中(S. Y. Hu, l. c., 1965)。