

4. 须弥香青

Anaphalis royleana DC., Prodr. 6: 272. 1937; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 280. 1881; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 137. 1902; Marq. in Journ. Linn. Soc. 48: 190. 1928; S. Y. Hu, in Quart. Journ. Taiw. Mus. 18, 1—2: 113. 1965.——*Anaphalis polylepis* DC., l. c. 272. 1837; C. B. Clarke, Comp. Ind. 104. 1876.——*Anaphalis royleana* DC. var. *royleana* proper Hook. f. l. c. 280. 1881.

“草本，基部多茎，分枝直立，或不分枝，被白色茸毛，叶无柄，稍贴生，长圆状线形，有小尖头，全缘，上面被尘状微糙毛，下面被近白色蛛丝状毛，头状花序7—9个，排列成伞房状，花序梗被白棉毛与花序同长，总苞片无毛，雪白色，外层卵圆形，较短，中层卵状长圆形，较花长，内层线状长圆形，与花盘等长”。（据 De Candolle）。又据 De Candolle, *A. polylepis* DC. 的“叶上面无毛，下面被白色棉毛，……与 *A. royleana* 接近，但小灌木，头状花序较小，有20—25花，雌花少数或无雌花”。后者似为本种的雄株。都产于印度西北部。“叶上面被微毛或微糙毛”。（据 Hooker f., var. *royleana* proper）。

根据前人记载及 De Candolle 的模式标本照片，此种似与珠光香青 *A. margaritacea* (L.) Benth. et Hook. f. 比较接近。茎下部多少木质，有分枝，叶密集，线状长圆形，长约2—3厘米，基部稍下延，顶端钝或尖，上面近无毛，下面被灰色或带红褐色棉毛，有1脉；头状花序密集成复伞房状，略似珠光香青，但较小；总苞片顶端钝或尖。此种分布于喜马拉雅西北部，据 Hemsley 及 Marquand，也产于我国西藏。未见到标本*。

5. 玉山香青

Anaphalis morrisonicola Hayata, Ic. Pl. Formos. 8: 516. 1919.——*Anaphalis margaritacea* Benth. var. *angustifolia* Hayata f. *nana* Hayata et f. *morrisonicola* Hayata, Pl. Mont. 128, 129. 1908.——*Anaphalis buisanensis* Hayata, l. c. 517. 1919.——*Anaphalis contorta* Hook. f. var. *morrisonicola* (Hayata) Yamam. in Journ. Trop. Agric. 8: 265. 1936.——*Anaphalis margaritacea* Benth. ssp. *morrisonicola* (Hayata) Kitam. in Kihara,

* 邻种 *A. griffithii* Hook. f., 据 Lévillé (Cat. Pl. Yunn. 37. 1915), 也产于云南, 但我们还未见到。*A. polylepis* DC. 是本种的异名。据 Gandoger (Bull. Soc. Bot. France, 70: 828. 1923) 所述, 也产于河北, 可能有误。