

Sin. 7; 1104. 1936, et in Act. Hort. Goth. 12; 239. 1938.

叶长1.5—6厘米,较宽,上面被疏蛛丝状毛或无毛,质薄,干后常透明。

产云南西部、西北部及中部(大理、景东、楚雄、昆明等)及贵州西部(黄草坝)。生于干燥或湿润山坡草地。海拔1700—3500米。

9. 多茎香青

Anaphalis hondae Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. 15; 78. 1953 et in Kihara, Fauna et Flora Nepal. Himal. 1; 243, f. 68. 1952—53.

根状茎横走,木质,有密生的细根。不育茎和花茎多数密集丛生。茎直立或斜升,高5—10厘米,细弱,基部木质,被白色或灰白色棉毛,下部后脱毛,通常不分枝,下部有发育的腋芽,全部有密集的叶。叶多少开展,下部叶在花期常枯萎,线形,长5—10毫米,宽1毫米,基部等宽,半抱茎;中部以上叶披针状线形,长10—15毫米,基部稍宽大,耳形,抱茎,顶端急尖,有小尖头,边缘反卷;全部叶被灰白色棉毛,中脉在下面稍凸起且被白色被密棉毛。不育茎较短,高2—4毫米,有较密的叶,顶部叶较宽短,倒卵圆形或匙形,边缘平。头状花序多数,在茎或枝端密集成伞房或复伞房状;花序梗长1—3毫米。总苞宽钟状,长4—5毫米,径5—6毫米,基部被棉毛;总苞片约4层,基部褐色,上部淡黄色,外层卵圆形,长约2毫米,内层长圆形,长4.2毫米,宽达1.5毫米,顶端钝或圆形,或稍撕裂,最内层倒披针形,有长达三分之二的爪部。花托蜂窝状。雄株头状花序全部有雄花。花冠长3—3.5毫米。冠毛较花冠稍短,顶端稍粗厚,有细锯齿。雌株未见到。花期7—10月。

产西藏南部(拉萨、亚东)。生于河滩沙地。也分布于尼泊尔。

此种的原记载,注明西藏的植物茎较低,但西藏的植物也有茎较高的。根状茎和不育茎的特征未经前人述及。此种在较近期间,被合并于旋叶香青 *A. contorta* Hook. f. 中 (Kitamura, in Hara, Fl. East. Himal. 331. 1966)。

系3. 帚枝系——*Ser. Virgatae* Boriss., in Fl. URSS. 25; 373. 1959.

亚灌木,有多次分枝,叶不沿茎下延;总苞长约5毫米;花序托蜂窝状。

单种的系。

10. 帚枝香青

Anaphalis virgata Thoms. in C. B. Clarke, Comp. Ind. 108. 1876; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3; 285. 1881; Boriss., in Fl. URSS. 25; 374. 1959.

多枝亚灌木,根状茎粗壮。茎直立或斜升,高20—40稀60厘米,下部木质,有多