

状披针形，长5—6米，在雄株宽达2毫米，在雌株宽1.5毫米，除基部外白色(干后常黄色)，顶端钝或急尖；最内层舌状或披针状线形，长约4毫米，有长达全长三分之二的爪部。花托有缝状短毛。雌株头状花序有多层雌花，中央有1—3个雄花；雄株头状花序全部有雄花。花冠长3.5—4毫米，冠毛较花冠稍长；雄花冠毛上部较宽扁，有锯齿。子房长0.8—1毫米，近无毛。花期8—9月。

产云南西北部(鹤庆、丽江、中甸)。生于山谷、沟旁、草地或云杉林下，海拔3100—3400米。

A. nervosa Ling 除叶上面不被粗伏毛与丽江香青 *A. likiangensis* (Franch.) Ling 略有不同外，其他特征完全相同，它可能为后者的一个变型。

16. 细弱香青

Anaphalis tenuisissima Chang, 中研丛刊, 5: 542. 1925 (spelm. "tenuisissima"); Hand.-Mazz. in Not. Gart. u. Mus. Berl.-Dahl. 13: 631. 1937, in adnot.; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 18, 1—2: 115. 1965.——*Antennaria serawschanica* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 418. 1901—11, non C. Winkl., nec *Anaphalis serawschanica* (C. Winkl.) Fedtsch.

“根状茎木质，横走，多分枝”(据 Handel-Mazzetti)。“茎直立或斜升，高达14厘米，径约1毫米，被白色蛛丝状毛”(据张肇箴)，“上部被稍带褐色的毛”(据 Handel-Mazzetti)，“不分枝，纤细，……节间长7—11毫米。叶倒披针形或狭匙形，上面绿色，无毛，几有光泽、下面被蛛丝状毛，有单脉，顶端钝至截形，基部长楔形，沿茎下延成狭翅，基部叶在花期常枯萎，长4—13毫米，宽2—2.5毫米；基部较稍大，直立至开展，上部叶线形，顶端常褐色干膜质毛状。花序顶生，伞房状密集，径约2厘米。头状花序4—6个，……梗长0—3毫米，被白色密蛛丝状毛。总苞狭钟状，长7.5—8毫米；总苞片约4层，全部直立，顶端钝，外层倒披针形，长4—5毫米，红褐色；中层长约7毫米，基部褐色及红色，顶端白色；内层(最内层)线形，长5.5—7毫米。中央的花不育，……约3个，花冠长约4毫米，……花冠长约3毫米，顶端稍粗厚；边缘的花约8个，花冠长约3.5毫米。瘦果长圆形，近无毛，长0.6毫米。冠毛白色，长3.5毫米”(据张肇箴)。

产四川西部(Wilson 3822)。

17. 江孜香青

Anaphalis desertii Drumm. in Kew Bull. 76. 1910.

根状茎细长，木质；匍枝细，有红褐色披针形鳞片和顶生的莲座状叶丛。茎从膝