

长圆形,长 0.8 毫米,长圆形,被乳头状突起。 花果期 8 月。

产西藏东部及南部(林芝、娘鲁)。生于山野路旁向阳地,海拔 3000—3060 米。

此种与广泛分布于亚洲东部的香青 *A. sinica* Hance. 极近似,但总苞片的层数较少,叶形及毛茸也与后者不同。这两个种的分布也是不连续的。此种的雄株尚未见到。

23. 能高香青

Anaphalis transnokoensis Sasaki, in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 21: 166. 1931; Kitam., Act. in Phytotax. et Geobot. 6: 81. 1937, et in Mem. Coll. Sc. Kyoto Univ. ser. B 13: 238. 1937; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 18, 1—2: 115. 1965.

“根状茎斜升。茎单生,非丛生,不分枝,直立,高 10—18 厘米,被密棉毛,至顶端有叶。根部叶莲座状,在花期枯萎,较中部叶小;茎部叶直立,狭长圆形,长 3—4 厘米,宽 9—12 毫米,顶端急尖(?),沿茎下延成宽短的翅,全缘,两面被棉毛和皱毛,上面绿色,下面浅色,质薄;上部叶较稍小。花序密伞房状。头状花序具异形花,总苞干后半球形,长 5 毫米,宽 9 毫米;总苞片 5 层,中层最长,较小花为长,顶端钝,中部以上白色,下部稍褐色,边缘雌花多数,花冠长 2.5 毫米,冠毛有细糙毛;雄花较少,管状,上部有腺,冠毛污白色,顶端稍粗厚,……。瘦果未见到。花托无毛。”(根据北村四郎记载)。 花期 8—10 月。

产我国台湾。

此种曾为北村四郎暂列于雌雄同株的组(“sect. *Nagasawae*” Kitam.) 中,但可能上述的记载是根据雌株写成,雄株尚未采到。

24. 黄腺香青 图版 26: 10—18

Anaphalis aureo-punctata Lingelsh et Borza in Fedde, Repert. Sp. Nov. 13: 392. 1914.

根状茎细或稍粗壮,有长达 12 或稀达 20 厘米的匍枝。茎直立或斜升,高 20—50 厘米,细或粗壮,不分枝,稀在花后有直立的花枝,草质或基部稍木质,被白色或灰白色蛛丝状棉毛,或下部多少脱毛,下部有密集、上部有渐疏的叶,莲座状叶宽匙状椭圆形,下部渐狭成长柄,常被密棉毛;下部叶在花期枯萎,匙形或披针状椭圆形,有具翅的柄,长 5—16 厘米,宽 1—6 厘米;中部叶稍小,多少开展,基部渐狭,沿茎下延成宽或狭翅,边缘平顶端急尖稀渐尖,有短或长尖头;上部叶小,披针状线形;全部叶上面被具柄腺毛及易脱落的蛛丝状毛,下面被白色或灰白色蛛丝状毛及腺毛,或多少脱毛,