

陷。

27. 厚衣香青 图版 26: 19—26

Anaphalis pachylaena Chen et Ling, 植物分类学报, 11: 106. 1966.

多年生草本, 全株被银灰色粘结成棉纸状的厚棉毛。根状茎粗厚, 木质; 分枝短、密集, 被枯叶残片, 有顶生的莲座状叶丛。茎从弯曲的基部直立, 高 20—50 厘米, 稍粗壮, 草质, 不脱毛, 下部有较密、上部有较疏的叶。莲座状叶匙状或倒卵圆状长圆形, 长 3—7 厘米, 宽 0.6—1.4 厘米, 基部渐狭成长柄, 顶端钝或圆形, 初被黄白色或灰白色厚棉毛, 后渐粘结成棉纸状毛。茎下部与莲座状叶近同形, 在花期渐枯萎, 中部叶多少直立, 匙状或线状长圆形, 长 3—7 厘米, 宽 0.3—0.8 厘米, 下部稍狭, 沿茎下延成狭翅, 边缘平, 顶端急尖, 上部叶线形, 有长尖头; 全部叶有 1 脉或不显明的三出脉, 中脉在下面高起。头状花序极多数, 在茎和枝端密集成复伞房状, 花序梗短至长达 4 毫米。总苞钟状, 长 4—5 毫米, 宽 3—4 毫米; 总苞片约 5 层, 外层卵圆形, 长 3 毫米, 基部黄褐色或深褐色, 有棉毛; 内层长圆形, 长 4.5 毫米, 宽 1.5 毫米, 白色(干后黄色), 顶端圆形; 最内层线状长圆形, 长约 3 毫米, 有长达全长三分之二的爪部。花托蜂窝状有尖突起。雌株头状花序有多层雌花, 中央有 1 或少数雄花; 雄株头状花序全部有雄花。花冠长 2—3 毫米。冠毛长约 3 毫米。雄花冠毛上部宽扁、有微齿。瘦果长 0.9 毫米, 有乳头状突起。花期 7—9 月, 果期 9—10 月。

产四川西南部(木里)。在高山及亚高山草坡常见, 海拔 3200—3800 米。

毛茸略似茧衣香青 *A. chlamydophylla* Diels, 但花序和总苞形状与黄腺香青 *A. aureo-punctata* Lingelsh et Borza 比较接近。

28. 西藏香青 图版 24: 1—13

Anaphalis tibetica Kitam. in Act. Phytotax. et Geobot. 15: 38, f. 2. 1953; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 18, 1—2: 115. 1965.

根颈粗壮, 灌木状, 多分枝, 根出条多数, 上部被枯叶残片, 与顶生的莲座状叶丛, 与花茎密集丛生。茎直立, 高 15—35 厘米, 纤细, 不分枝, 下部木质, 常宿存, 被蛛丝状疏棉毛及头状具柄腺毛, 下部多少脱毛, 全部有密生的叶。下部叶较短, 在花期枯萎; 中部叶多少开展, 线形, 长 2—3.5 厘米, 宽 0.3—0.5 厘米, 基部沿茎下延成狭长的翅, 边缘波状反卷, 顶端稍钝, 无明显的小尖头, 顶部叶渐小, 渐尖; 全部叶上面绿色, 被头状具柄腺毛, 下面被白色密棉毛, 有在下面稍高起的单脉。头状花序十余个至数十个, 在茎和枝端密集成复伞房状, 无花序梗, 总花序梗被白色棉毛。总苞狭钟状, 长 4—6 毫米, 宽 3—4 毫米; 总苞片约 4—5 层, 外层宽卵圆形, 长 2.5 毫米, 不规则齿裂,

浅或深褐色，被棉毛；内层椭圆形，长4.2—5毫米，宽达2毫米，浅黄色，顶端圆形；最内层匙状线形，稍短，有长达全长三分之二的爪部；雌株的总苞常较小。花托有锯状短毛。雌株头状花序外围有多层雌花，中央有1—4个雄花；雄株头状花序全部有雄花。花冠长3.5—4毫米。冠毛约与花冠等长，雄花冠毛上部粗扁，有锯齿。瘦果长圆形，长0.8毫米，被微毛。花期7—8月，果期8—9月。


产西藏南部（打格章、隆子、拉萨、日喀则）。生于高山及亚高山针叶林下，灌丛中或山坡阳地，海拔3800—4100米。

此种的模式采于西藏南部（拉萨），据原始记载，“总苞长3—3.5毫米”，“瘦果无毛”。我们见到的标本总苞较大，瘦果有毛，虽与此种的原始记载不符合，但仍应视为同一种。模式标本据原插图可能是头状花序未完全开放的植株，所以总苞较小。此种与江孜香青 *A. deserti* Drumm. 略相似，但后者的头状花序较大，叶上面初被蛛丝状毛，后多少脱毛，且茎有被棉毛的腋芽或短分枝，有疏生的叶（节间长3—4厘米），与本种（节间0.5—1厘米，稀达1.5厘米）不难区别。

29. 萌条香青

Anaphalis surculosa (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz. in Act. Hort. Goth. 12: 243. 1938; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiw. Mus. 18, 1—2: 115. 1965.—*Anaphalis pterocaula* Maxim. var. *surculosa* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1103. 1936.—*Anaphalis araneosa* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 2 ser. 10: 75. 1888, non DC., fide Hand.-Mazz.

根状茎粗壮，木质。茎下部横走或斜升，有斜升的分枝，高50—100厘米，粗壮，有沟及棱，下部木质，宿存；当年枝草质，被蛛丝状毛及头状具柄腺毛，后下部常脱毛，常有被密茸毛的腋芽或短枝，下部有较密的叶。下部叶在花期枯萎，中部叶开展、线形、线状披针形或长圆形，长3—8厘米，宽0.5—1稀达1.5厘米，下部渐狭、沿茎下延成宽1.5—3毫米的楔形或狭长的翅、边缘平或波状，顶端尖，有细长尖；上部叶渐小；顶部叶线形或钻形，渐细尖，苞叶状；全部叶质薄，两面被头状具柄腺毛，下面或两面被疏蛛丝状或下面有腺点，有离基三出脉。头状花序极多数，密集成复伞房状，花序梗短或达3毫米。总苞近钟形，长4—5毫米，径3—4毫米；总苞片约6层，外层卵圆形，浅褐色，长约2毫米；内层椭圆形或匙状椭圆形，长达4毫米，在雄株宽达毫米，在雌株宽不超过1.5毫米，白色，顶端圆形；最内层近匙形，长约4毫米，白色，有长约全长三分之二的爪部。花托有膜片状毛。雌株头状花序多层雌花，中央有1—2个雄花。雄株头状花序全部有雄花。冠毛较花冠稍长；雄花冠毛上部较粗扁，有锯齿。瘦果长



1—13. 西藏香青 *Anaphalis tibetica* Kitam., 1—2. 植株; 3. 头状花序; 4. 外层总苞片; 5、6. 中层总苞片; 7. 内层总苞片; 8. 雌花; 9. 雌花的冠毛; 10. 花柱枝; 11. 雄花; 12. 雄花的冠毛; 13. 雄蕊。14—26. 丽江香青 *Anaphalis likiangensis* (Franch.) Ling., 14—15. 植株; 16. 头状花序; 17. 外层总苞片; 18. 中层总苞片; 19. 内层总苞片; 20. 雌花; 21. 雌花的冠毛; 22. 花柱枝; 23. 雄花; 24. 雄花的冠毛; 25. 雄蕊; 26. 瘦果。(刘春荣绘)